


ذ: خالد هشامي

السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي

٣



فوج

الرئاسة

امتحانات جهوية مصححة

## الفهرس

03 .....	مقدمة
04 .....	ملخص الدروس
31_29..... تصحيح الامتحان 01	الامتحان 01 جهة : سوس ماسة درعة 2011_05_06 ...
34_32..... تصحيح الامتحان 02	الامتحان 02 جهة : تادلا ازيلال 2010_06_08 ...
37_35..... تصحيح الامتحان 03	الامتحان 03 جهة : سوس ماسة درعة 2010_09_08 ....
41_37..... تصحيح الامتحان 04	الامتحان 04 جهة : الغرب الشراردة 2010_10_11.....
44_41..... تصحيح الامتحان 05	الامتحان 05 جهة : دكالة عبدة 2009_12_13.....
47_45..... تصحيح الامتحان 06	الامتحان 06 جهة: الشرقية وجدة 14_15_15.....
49_47..... تصحيح الامتحان 07	الامتحان 07 جهة : سوس ماسة درعة 2009_15_16....
52_49..... تصحيح الامتحان 08	الامتحان 08 جهة: سوس ماسة درعة 2008_17_18....
54_52..... تصحيح الامتحان 09	الامتحان 09 جهة : سوس ماسة درعة 2007_18_19....
57_55..... تصحيح الامتحان 10	الامتحان 10 جهة: دكالة عبدة 2007_19_20.....
59_57..... تصحيح الامتحان 11	الامتحان 11 جهة: مراكش تانسيفت 21_22_22.....
62_59..... تصحيح الامتحان 12	الامتحان 12 جهة : مكناس تافيلالت 23_24_24....
64_62..... تصحيح الامتحان 13	الامتحان 13 جهة: فاس بولمان 24_25_25.....
67_64..... تصحيح الامتحان 14	الامتحان 14 جهة : دكالة عبدة 2006_25_27....
70_67..... تصحيح الامتحان 15	الامتحان 15 جهة: سوس ماسة درعة 2006_27_28....
70.....	خاتمة

## مقدمة

إن الحمد لله نحمده و نستعين به و الصلاة و السلام على رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم أما بعد :

**قال تعالى : يرفع الله الذين امنوا منكم و الذين أتوا العلم درجات**

إن العلم ركيزة أساسية اقرها الله عز وجل في أكثر من آية و يعتبر أساس الرقي و التطور لا سيما

في ظل زمن الذل الذي نعيشه لهذا ادعوا جميع التلاميذ إلى الجد والاجتهد وفي هذا الاطار أضع

بين أيديكم هذا العمل المتواضع المتمثل في المساعد الجهوبي الذي يوفر لكم امتحانات جهوية

مصححة لمجموعة من الأكاديميات بالمملكة و التركيز على جهة سوس ماسة درعة التي تنتهي إليها .

قبل الشروع في العمل أوجه لكم مجموعة من النصائح :

► قراءة الموضوع جيدا

► اختيار التمارين السهل

► إذا واجهت (ي) أي صعوبة ارجع (ي) إلى الدرس او إلى تمرين مماثل

► ارجع (ي) إلى الحل المقدم للتتأكد من حلك

و السلام

نـ: خالد هشامي

أستاذ الرياضيات بالثانوية الاعدادية الزيتونة

عين أولاد جرار

نيابة تيزنيت

Mathematique .khalid@gmail.com ou facebook (khalid hichami)

[www.Hichami.eu5.org](http://www.Hichami.eu5.org)

سألـكم الدعـاء

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$  يعني  $B$  منتصف  $[AC]$

$M$  صورة  $N$  بالازاحة التي تحول  $A$  إلى  $B$  يعني

$$\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{AB}$$

الازاحة تحافظ على المسافة وعلى استقامة النقطة وعلى قياس الزوايا وصورة مستقيم هو مستقيم يوازيه

زوج احداثي المتجهة  $(x_B - x_A; y_B - y_A)$

زوج احداثي  $I$  منتصف  $[AB]$ :  $I\left(\frac{x_B + x_A}{2}; \frac{y_B + y_A}{2}\right)$

المسافة  $AB$  هي:  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

$\begin{cases} x_B - x_A = x_C - x_D \\ y_B - y_A = y_C - y_D \end{cases}$  يعني:  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

### معادلة مستقيم

الصيغة المختصرة لمستقيم  $(D)$  هي كل منسارية تكتب على

$(D): y = mx + p$

$m = \frac{y_M - y_N}{x_M - x_N}$  يمر من  $M$  و  $N$  يعني:

النقطة  $A$  تنتمي إلى  $(D)$  يجب ان يتحقق:

$$y_A = m \times x_A + p$$

$m_{(D)} = m_{(\Delta)}$  يعني:

$m_{(D)} \times m_{(\Delta)} = -1$

اذكان  $m_{(D)} \neq m_{(\Delta)}$  يعني انهمما مقاطعان

### الدالة الخطية و التألفية

الدالة الخطية  $f$  هي كل دالة تمثيلها مستقيم يمر من

اصل المعلم و صيغتها  $a \frac{f(x)}{x}$  يمر من  $a$

$f(x_A) = a \times x_A$  يتحقق:

الدالة التألفية  $g$  هي كل دالة تمثيلها مستقيم صيغتها

$$a = \frac{g(x) - g(x')}{x - x'}, g(x) = ax + b$$

الحل المباني للمعادلة  $(x) = g(x) = f(x)$  هو اقصول نقطة

تقاطع التمثيلين

### الحجم و المساحات و التكبير و التطغير

يكون مستقيم عمودي على مستوى اذا كان عموديا على مستقيمين مقاطعين ضمن ذلك المستوى

اذا كان مستقيم عمودي على مستوى في نقطة معينة فهو عمودي على المستقيمات المارة من تلك النقطة.

حجم متوازي المستطيلات ابعاده  $a$  و  $b$  و  $c$  هو  $V = abc$

حجم متوازي المكعب بعده  $a$  هو  $V = a^3$

حجم الاسطوانة القائمة هو  $V = \pi r^2 h$

حجم الهرم هو  $V = \frac{h \times S_B}{3}$

نسبة التكبير باستعمال الاظلاع المتناسبة  $k = \frac{\text{الصلع الجديد}}{\text{الصلع القديم}}$

او المساحات المتناسبة  $k^2 = \frac{\text{المساحة الجديدة}}{\text{المساحة القديمة}}$

### اهم القواعد و المهارات

#### المعادلات و المترابحات

##### تقنيات حل المعادلات

اذا كانت المعادلة من الدرجة الاولى بمجهول واحد فالطريقة هي عزل الاعداد المجهولة في طرف و الاعداد المعلومة في الطرف الآخر

اذا كانت المعادلة ليست من الدرجة الاولى وبمجهول واحد فالطريقة هي تحويل جميع الحدود الى نفس الطرف و تعديل التعبير (باستعمال العامل المشترك او المتطابقات الهمزة او هما معا) للحصول على جداء منعدم ( $a \times b = 0$ ) يعني  $a = 0$  او  $b = 0$

##### تقنية حل المترابحات

اذا كانت المترابحة من الدرجة الاولى بمجهول واحد فالطريقة هي عزل الاعداد المجهولة في طرف و الاعداد المعلومة في الطرف الآخر مع الانتباه الى قواعد الترتيب خاصة عند الضرب او القسمة على عدد سالب

##### منهجية حل المسائل

- قراءة المسالة جيدا
- تحديد المجهول او المجاهيل
- صياغة معادلة او مترابحة او نظمة
- حل المعادلة او المترابحة او النظمة
- التحقق من الحل
- تأويل النتيجة

##### نظمة معادلتين

##### تقنيات حل النظم

##### طريقة التعويض

وتعتمد على ايجاد تعبير احد المجهولين من احدي المعادلتين و تعويضه في الاخر و تضل هذه الطريقة جيدة مع الاشاره الى صعوبتها في بعض الحالات.

##### طريقة التألفية الخطية

تعتمد على البحث عن عددين بعد ضربهما في المعادلتين نحصل على عددين مجهولين متساوين ثم نطرح المعادلتين طرفا بطرف للحصول على معادلة تضم مجهولا واحدا و بعد ايجاد قيمته نعوضه في احدي المعادلتين الاصليتين (نفس المجهول) و يمكن اعتماد هذه التقنية في جميع الحالات

**الحل المباني:** هو احداثي نقطة تقاطع المستقيمين

##### الإخطاء

**المنوال:** هو قيمة الميزة التي لها اكبر حصيص

**المعدل الحسابي او القيمة المتوسطة:** هو مجموع جداءات كل قيمة من قيم الميزة و الحصيص المواقف لها مقسم على الحصيص الاجمالي

**القيمة الوسطية:** هي القيمة التي تقسم المتسلسلة الاحصائية الى متسلسلتين لهما نفس الحصيص وللحصول عليها ننجذ او لا جدولا للحصصيات المتراكمة ثم نبحث عن الحصيص المترافق الاقرب مباشرة من نصف الحصيص الاجمالي هذا الحصيص

المترافق قيمة الميزة المواقف له هي القيمة الوسطية للمتسلسلة

##### المتجهات - المعلم في المستوى

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  يعني  $ABDC$  ان متوازي الاظلاع

## الأكاديمية الجهوية : سوس ماسة درعة

الامتحان رقم 01

1

2

الامتحان الجهوي الموحد  
لليل شهادة السلك الاعدادي

الساعة: الرياضيات

مدة الاجازة: ساعتان

المهام: 3

ال موضوع

الدورة: يونيو 2011

التمرين الأول: 2.5 ن

1) حل المعادلة:  $3x + 1 = x - 2$ 2) حل المترابحة:  $2x - 1 \geq x + 1$ 

التمرين الثاني: 2 ن

يتمثل الكشف التالي متسلسلة إحصائية:

الحصisce	5	4	3	2	قيمة الميزة
الحصisce	4	2	5	3	الحصisce

1) حدد منوال المتسلسلة الإحصائية.

2) احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية.

التمرين الثالث: 6 ن

المستوى منسوب لمعلم متعمد منظم ( $O, I, J$ )1) أ- أنشئ  $(AB)$  علماً أن  $A(3, 3)$  و  $B(-3, -1)$ ب- أنشئ  $(\Delta)$  المار من النقطة  $C(2, 1)$  و العمودي على  $(AB)$ 2) أ- بين أن  $y = \frac{2}{3}x + 1$  هي معادلة مختصرة لمستقيم  $(AB)$ ب- استنتج المعادلة المختصرة لـ  $(\Delta)$ 

$$\begin{cases} 2x - 3y = -3 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$$

ب- حدد إحداثي المسقط العمودي للنقطة  $C$  على  $(AB)$ 

التمرين الرابع: 6.5 ن

1) دالة خطية بحيث  $f(2) = 1$ أ- أنشئ التمثيل البياني  $(D)$  للدالة في معلم متعمد منظم في المستوىب- بين انه لكل عدد حقيقي  $x$ :  $f(x) = \frac{1}{2}x$ 2) تعتبر النقطتين  $E(4, 2)$  و  $F(2, 4)$  والإزاحة  $T$  التي تحول  $E$  إلى  $F$ أ- تحقق من أن النقطة  $E$  تنتهي إلى  $(D)$ ب- أنشئ  $(D')$  صورة المستقيم  $(D)$  بالإزاحة  $T$ ت- حدد احداثي النقطة  $G$  علماً أن  $E$  هو منتصف  $[GF]$ ث- بين أن النقطة  $E$  هي صورة النقطة  $G$  بالإزاحة  $T$ 3) لتكن  $g$  الدالة التالية التي تمثلها البياني هو المستقيم  $(D')$ أ- حدد  $g(2)$ ب- حدد صيغة الدالة  $g$

دورة : يونيو 2011	2	الموظفون	الاكاديمية الجهوية سوس ماسة درعة
	2		

## التمرين الخامس :


متوازي المستطيلات بحيث  $AB = 6\text{cm}$  و  $AD = 3\text{cm}$  و  $AE = 4\text{cm}$   $ABCDEFGH$

1- احس حجم الهرم  $AEGH$

2- لتكن  $I$  نقطة من نصف المستقيم  $(AE)$  بحيث  $AI = 6\text{cm}$  المستوى  $(P)$  المار من  $I$  و الموازي للمستوى  $(EFG)$  يقطع المستقيمات  $(AF)$  و  $(AG)$  و  $(AH)$  في  $J$  و  $K$  و  $L$  على التوالي

أ- تحقق من أن الهرم  $Aijkl$  هو تكبير للهرم  $Aefgh$  نسبته  $\frac{3}{2}$

بـ- احسب طول و عرض المستطيل  $IJKL$



## الأكاديمية الجهوية : تارلا ازيدال

الامتحان رقم 02

## الامتحان الجهو<sup>ي</sup> المودد

## نيل شهادة السالك الـ عداد<sup>ي</sup>

## **المادة: الرياضيات**

مدة الانجاز: ساده

3 المُعَالِجُون

الموظفون

الدورة : يونيو 2010

التمرين الأول : 5 نقط

**1- حل المعادلتين التاليتين :**  $(x-1)^2 + (3x+5)(x-1) = 0$  و  $14x - 4 = 11 - x$

$$3x + 1 \leq 9 - x \quad : \text{حل المتراجحة} - 2$$

$$\begin{cases} 2x - 3y = \\ x + y = 2 \end{cases}$$

دورة : يونيو 2010

2

3

وَعْ

الْمَوْضُوع


الاَكادِيمِيَّة الجَهْوِيَّة

تَادِلا اَزِيلَاد

4- واجب زيارة معرض تجاري هو 3 دراهم للأطفال و 7 دراهم للكبار . أدى فوج متكون من 50 زائراً لزيارة هذا المعرض 290 درهماً لزيارة هذا المعرض . ما هو عدد الأطفال و عدد الكبار في الفوج المذكور ؟ علل جوابك

**التمرين الثاني: 2 نقط**

نعتبر المتسلسلة الإحصائية الممثلة بالمبيان أسفله :



1- انقل الجدول في ورقة تحريرك واتم ملأه باستعمال المبيان :

الميزة	5	4	3	2	1
الحصيص	....	6	...	4	...

2- حدد منوال المتسلسلة الإحصائية

3) احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية ..

4) حدد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة .

**التمرين الثالث: 5 نقط**

لتكن  $f$  الدالة التاليفية بحيث  $-1 = \frac{3}{2}x = f(x)$  والتي تمثلها المبيانى هو المستقيم ( $D$ ) في معلم متعمد منظم

 $(O, I, J)$ 1- أ- احسب  $f(2)$ ب-حدد العدد الذي صورته (-1) بالدالة  $f$ 

2- لتكن  $g$  دالة خطية بحيث  $-\frac{2}{3}x = g(x)$  والتي تمثلها المبيانى هو المستقيم ( $\Delta$ ) في  $(O, I, J)$

أ- احسب  $g(3)$ ب-أثبت أن  $(D)$  عمودي على  $(\Delta)$ ت- أ- أنشئ  $(D)$  و  $(\Delta)$  في نفس المعلم  $(O, I, J)$ ث- حدد مبيانيا العدد الذي صورته 1 بالدالة  $g$ **التمرين الرابع : 5 نقط**في المستوى المنسوب لمعلم متعمد منظم  $(O, I, J)$  نعتبر النقاطين  $A(0,3)$  و  $B(2,0)$ 1- أ- حدد زوج إحداثي المتجهة :  $\overrightarrow{AB}$ ب- احسب  $AB$ ج- بين أن  $y = -\frac{3}{2}x + 3$  هي معادلة مختصرة للمستقيم  $(AB)$

دورة : يونيو 2010


3

3

الموضوع

الأكاديمية الجهوية

قادلا ازيلا

2- لتكن النقطة  $C$  صورة النقطة  $B$  بالإزاحة  $T$  التي تحول  $A$  إلى  $B$ أ- أثبت أن  $B$  منتصف  $[AC]$ ب- حدد زوج إحداثي النقطة  $C$ ج- أثبت أن صورة المستقيم  $(AB)$  بالإزاحة  $T$  هي  $(AB)$ د- حدد المعادلة المختصرة للمستقيم  $(T)$  الموازي ل  $(AB)$  والمار من  $O$  أصل المعلم  $(O,I,J)$ **التمرين الخامس : 3 نقط**متوازي المستطيلات قائم بحيث  $ABCD$  مربع صول ضلعه  $2\text{cm}$  و  $DH = 4\text{cm}$ و  $I$  منتصف  $[BC]$ 1- أثبت أن  $IDH$  مثلث قائم الزاوية في  $D$ 2- احسب المسافتين  $ID$  و  $IH$ 3- ليكن  $V$  حجم المجسم  $DBCHFG$  بين أن :  $V = 8\text{cm}^3$ 4- تكبير المجسم  $DBCHFG$  بنسبة  $k$  أعطى مجسمًا حجمه  $27\text{cm}^3$ احسب  $k$ **الأكاديمية الجهوية : سوس ماسة درعة****الامتحان رقم 03**

1

2

**الامتحان الجهوي الموحد  
لنيل شهادة السلك الاعدادي****المادة: الرياضيات****مدة الانجاز: ساعتان****المهام:****الموضوع****الدورة : يونيو 2010****التمرين الأول : 2 نقط**1- حل المعادلة :  $3(4x + 2) - 3 = 5x$ 2- حل المتراجحة :  $5x - 2 < 2(x + 5)$ **التمرين الثاني: 2 نقط**



يعطي الجدول التالي عدد أطفال كل أسرة من الأسر القاطنة في عمارة سكنية :

5	4	3	2	1	عدد الأسر
4	5	8	6	2	عدد الأطفال

1- احسب معدل أطفال هذه الأسر .

ما هو عدد الأسر التي يفوق عدد أطفالها المعدل ؟.

الاـكـادـيـمـيـةـ الجـهـوـيـةـ	سـوـسـ مـاـسـةـ درـرـةـ	الـمـوـضـعـ	دـوـرـةـ :ـ يـوـنـيـوـ 2010	2		
			2			
<b>التمرين الثالث: 4 نقط</b>						
المستوى منسوب لمعلم متعامد منظم $(O, I, J)$						
1- حدد المعادلة المختصرة لل المستقيم $(D)$ الذي ميله $-2$ و يمر من $A(1, -1)$						
2- حدد احداثي $\overrightarrow{AB}$ ثم احسب $AB$ علما ان $B(3, 0)$						
3- ليكن $(\Delta)$ المستقيم المحدد بالمعادلة المختصرة: $y = \frac{1}{2}x - 2$						
أ- تحقق من ان $(\Delta)$ و $(D)$ متعامدان						
ب- حدد الوضع النسبي ل $(D)$ و $(AB)$						
<b>التمرين الرابع : 6 نقط</b>						
1- دالة خطية بحيث $f(2) = 3$ حدد صيغة $f$						
2- معلم متعامد منظم $(O, I, J)$ مستقيم يمثل الدالة العددية $g$ و $E$ و $F$ نقطتان منه						
(a) هل $g$ خطية ؟						
(b) احسب $g(-2)$						
3- حدد العدد الذي صورته $\frac{3}{2}$ بالدالة $g$ معللا جوابك دون تحديد معادلة $(d)$						
4- أنشئ $F'$ صورة $F$ بالإزاحة التي تحول $E$ إلى $O$						
5- بين ان صورة $(d)$ بالإزاحة هي التمثيل المباني للدالة $f$						
<b>التمرين الخامس : 3 نقط</b>						
اشترى صديقان من متجر مصابيح كهربائية . دفع احدهما مبلغ 31 مقابل مصباح اقتصادي واحد و ثلاثة عادية . ودفع الآخر 57 درهما مقابل مصابيح اقتصاديين و خمسة مصابيح عادية						
اعطيا لك 100 درهما و طلبت منك شراء مصابيح من هذا المتجر بحيث يكون عدد المصابيح العادية ضعف عدد المصابيح الاقتصادية						
ما هو العدد الأقصى من المصابيح التي يمكن شراؤها ؟						

**التمرين السادس : 3 نقط**

اشترى صديقان من متجر مصابيح كهربائية . دفع احدهما مبلغ 31 مقابل مصباح اقتصادي واحد و ثلاثة عادية . ودفع الآخر 57 درهما مقابل مصابيح اقتصاديين و خمسة مصابيح عادية  
اعطيا لك 100 درهما و طلبت منك شراء مصابيح من هذا المتجر بحيث يكون عدد المصابيح العادية ضعف عدد المصابيح الاقتصادية  
ما هو العدد الأقصى من المصابيح التي يمكن شراؤها ؟

## الأكاديمية الجهوّية : الغرب الشراردة بنى احسن

الامتحان رقم 04

1

2

الامتحان الجهوّي الموحد  
لنيل شهادة السلك الاعدادي

السادة: الرياضيات

مدة الإنجاز: ساعة

المعامل: 3

الموعد

الدورة: يونيو 2010

التمرين الأول: 2 نقط

الجدول التالي يمثل مقادير مساهمة 50 تلميذا في عمل خيري :

100	50	20	10	5	الميزة ( مقدار المساهمة بالدرهم)
06	09	12	13	10	الحصيص

1- حدد منوال هذه المتسلسلة الإحصائية

2- احسب القيمة الوسطية

3- احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة

التمرين الثاني: 5 نقط

1- أ- حل كلا من المعادلتين:  $(E_1) : x - \sqrt{3} = 0$  و  $(E_2) : \sqrt{3}x - 1 = 0$ 


$$(x - \sqrt{3})(\sqrt{3}x - 1) = \sqrt{3}x^2 - 4x + \sqrt{3}$$

ج- استنتج حل المعادلة:  $\sqrt{3}x^2 - 4x + \sqrt{3} = 0$ 2- حل المترابحة:  $\frac{x-1}{2} - \frac{2x+3}{2} \leq \frac{x}{6}$ 3- أ حل النظمة  $(S_1)$  بطريقة التعويضب- حل النظمة  $(S_2)$  بطريقة التالية الخطية

التمرين الثالث: 6 نقط

المستوى منسوب لمعلم متعدد منتظم  $(O, I, J)$  نعتبر النقطنريد أن نحدد بطرريقتين مختلفتين طبيعة الرباعي  $ABCD$  الطريقة الأولى:1- بين أن  $D$  هي صورة  $C$  بالإزاحة ذات المتجهة  $\overrightarrow{BA}$ 2- احسب المسافتين  $AB$  و  $BC$ 3- استنتاج طبيعة الرباعي  $ABCD$  (عل جوابك)

الطريقة الثانية:

1) بين أن المعادلة المختصرة لل المستقيم  $(AC)$  هي:  $y = 2x + 1$ 2) بين أن المعادلة المختصرة لل المستقيم  $(BD)$  هي:  $y = -\frac{1}{2}x + 1$ 3) استنتاج أن  $(AC)$  و  $(BD)$  متعددان4) تحقق من أن  $J(0,1)$  تتنمي لل المستقيمين  $(AC)$  و  $(BD)$ 

الاكارديمية الجهوية الغرب الشراردة بنى احسن	المو	وع	2	2	دورة : يونيو 2010

التمرین الرابع : 4 نقط

نعتبر الدالة الخطية  $f$  بحيث  $f(2) = 4$  و الدالة التالفية  $g$  بحيث لكل  $x$ :  $g(x) = x + 2$  و الدالة التالفية  $h$  بحيث لكل  $x$ :  $h(4) - h(2) = -2$  و  $h(3) = 3$

1- أبین أن لكل  $x$ :  $f(x) = 2x$

ب- بین أن لكل  $x$ :  $h(x) = -x + 6$

2- (d<sub>1</sub>) و (d<sub>2</sub>) و (d<sub>3</sub>) ثلاثة مستقيمات في المعلم المتعامد الممنظم (O,I,J) (انظر الشكل) من بين هذه المستقيمات حدد لكل دالة من الدوال  $f$  و  $g$  و  $h$  المستقيم الذي هو تمثيلها المباني (معللاً جوابك)

3- حدد مبيانيا العدد  $a$  بحيث:  $f(a) = g(a) = h(a)$

التمرین الخامس : 3 نقط

نعتبر هرما  $SABC$  بحيث  $SA = SB = SC = 6\text{cm}$  و الأوجه  $SAB$  و  $SBC$   $SAB$  و مثلثات قائمة الزاوية في  $S$  (انظر الشكل)

1- تحقق أن حجم الهرم  $SABC$  هو  $36\text{cm}^3$

2- بين أن المثلث  $ABC$  متساوي الأضلاع طول ضلعه  $6\sqrt{2}$

3- ليكن  $H$  منتصف الضلع  $[BC]$

أ- بين أن  $AH = 3\sqrt{6}$

ب- استنتج مساحة المثلث  $ABC$

4- لتكن  $K$  نقطة من المستوى  $(ABC)$  بحيث  $SK$  ارتفاع للهرم  $SABC$  احسب  $SK$

## الأكاديمية الجهوية : دكالة عبدة

## الامتحان رقم 05

1

2

الامتحان الجهوي الموحد  
للبيل شهادة السلك الاعدادي

الساعة: الرياضيات

مدة الاجازة: ساعة

المعامل: 3

ال موضوع

الساعة: يونيو 2009

## التمرين الأول: 3 نقط

$$\begin{cases} 2x + 5y = 130 \\ x + y = 35 \end{cases}$$

بـ في جيب محمد 35 قطعة نقدية بعضها من فئة 5 دراهم والبعض الآخر من فئة درهمين .  
حدد عدد القطع النقدية من كل فئة ، علما أن المبلغ الذي في جيب محمد هو 130 درهما

2- حل المترابطة :  $2x \leq \frac{2}{3}x + 4$  و مثل حلولها على مستقيم مدرج

## التمرين الثاني: 5 نقط

1- أ- اوجد الدالة الخطية  $f$  التي يمر تمثيلها المباني من النقطة  $I(1;2)$

بـ اوجد الدالة التألفية  $g$  علما أن  $g(0) = 4$  و  $g(-6) = 0$

2- نعتبر الدالتين  $f$  و  $g$  المعرفتين بما يلي  $f(x) = 2x$  و  $g(x) = \frac{2}{3}x + 4$

أ- احسب  $f(2)$  و  $g(3)$

بـ حل المعادلة  $\frac{2}{3}x + 4 = 2x$  . ما هو العدد الذي صورته هي 5 بالدالة  $g$  ؟

3- أ- أنشئ التمثيلين المبانيين للدالتين  $f$  و  $g$  في نفس المعلم المتعارف المنظم

بـ حدد أقصى نقطة تقاطع تمثيل المباني للدالة  $g$  مع محور الأفاسيل

4- أـ حل المعادلة  $\frac{2}{3}x + 4 = 2x$

بـ ما هي نقطة تقاطع التمثيلين المبانيين للدلتين  $f$  و  $g$  ؟

## التمرين الثالث: 2 نقط

1- نعتبر المتسلسلة الممثلة في الشكل جانبه

(a) انقل الجدول التالي في روفة تحريرك ثم اتم ملأه


الصنف	[80;100[	[60;80[	[40;60[	[20;40[	[0;20[
الحصيص			16	10	4

(b) ما هو منوال هذه المتسلسلة ؟

(c) حدد الحصيص المترافق للصنف

2- احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة

3- حدد الصنف الذي يحتوي القيمة الوسطية



الموضوع	الاكمالية الجهوية لكلية عبدة
دورة : يونيو 2009	2 2

التمرين الرابع : 2,5 نقط

متلث قائم الزاوية في النقطة  $A$  و  $I$  نقطة من القطعة  $[BC]$  نسمى  $T$  الإزاحة التي تحول النقطة  $A$  إلى  $I$

- أنشئ  $B'$  و  $C'$  صورتي النقطتين  $B$  و  $C$  بالإزاحة  $T$
- أـ ما هي صورة المتلث  $ABC$  بالإزاحة  $T$  ؟
- بـ استنتج قياس الزاوية  $B'IC'$

التمرين الخامس : 4 نقط

المستوى منسوب إلى معلم متعمد منظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  ، نعتبر النقط  $A(3;1)$  و  $B(1;7)$  و  $C(-1;3)$  و  $M(2;4)$

- أـ مثل النقط  $A$  و  $C$  و  $M$  في المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$
- بـ تحقق أن النقطة  $M$  هي منتصف القطعة  $[AB]$
- أـ احسب المسافتين  $AM$  و  $OA$
- بـ حدد إحداثيي المتجهة  $\overrightarrow{OA}$  و إحداثيي المتجهة  $\overrightarrow{CM}$
- أـ بين أن المعادلة المختصرة للمستقيم  $(OA)$  هي  $y = \frac{1}{3}x$
- بـ بين أن المعادلة المختصرة للمستقيم  $(AB)$  هي  $y = -3x + 10$
- جـ بين أن المستقيمين  $(OA)$  و  $(AB)$  متعمدان .

التمرين السادس : 3 نقط

في الشكل جانب  $ABCDA'B'C'D'$  مكعب حرفه  $6cm$  و  $I$  و  $J$  منتصفان  $[AB]$  و  $[BC]$  بحيث  $S$  هي مماثلة النقطة  $B'$  بالنسبة للنقطة  $B$

- أـ تتحقق أن  $SB' = 12cm$
- بـ احسب  $SA'$
- جـ بين ان النقطة  $I$  هي منتصف  $[SA']$
- أـ احسب حجم المكعب  $ABCDA'B'C'D'$
- بـ بين ان حجم الهرم  $SA'B'C'$  هو  $72cm^3$
- نعتبر ان الهرم  $SIBJ$  هو تصغير للهرم  $SA'B'C'$   
أـ حدد نسبة التصغير  
بـ استنتاج حجم الهرم  $SIBJ$

\*\*\*\*\*

# الأكاديمية الجهوية : الجهة الشرقية وجدة

1

2

## الامتحان رقم 06

**ال المادة: الرياضيات**

**مدة الإنجاز: ساعة**

**المُعَامل:** 3

**الدورة: يونيو 2009**

### التمرين الأول : 5 نقط

1- حل المعادلة:  $7x + 5 = 3x + 2$

2- أ- عمل التعبير التالي  $A = (3x + 8)^2 - 16$

ب-استنتج حل المعادلة:  $(3x + 8)^2 = 16$

3- حل المترابحة:  $3x + 5 \leq 2(x + 3)$

4- حل جبريا النظمة:  $\begin{cases} 6x + 7y = 8 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$

### التمرين الثاني: 2 نقط

مثلث في المستوى  $ABC$

1- انشئ النقطة  $D$  بحيث  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

2- انشئ النقطة  $E$  صورة النقطة  $C$  بالازاحة التي تحول  $B$  الى  $A$

3- أ- بين ان المستقيم  $(BC)$  يوازي المستقيم  $(AE)$

ب-احسب المسافة  $DE$  بدلالة المسافة  $AB$  على جوابك

### التمرين الثالث: 4 نقط

المستوى منسوب لمعلم متعامد منظم  $(O, i, \vec{i}, j, \vec{j})$

نعتبر المستقيم  $(D)$  الذي معادلته  $y = 2x + 6$  و النقطتين  $J(1; 0)$  و  $B(-4; 3)$

1- حدد زوج احداثي النقطة  $E$  منتصف القطعة  $[JB]$

2- بين ان المعادلة المختصرة للمستقيم  $(JB)$  هي  $y = -\frac{1}{2}x + 1$

3- أ- تحقق ان  $(JB)$  و  $(D)$  متعامدان

ب-بين ان المستقيم  $(D)$  واسط القطعة  $[JB]$

### التمرين الرابع : 4 نقط

يمثل الشكل جانبه التمثيل المباني لدالة تألفية  $f$  في

معلم  $(O, i, \vec{i}, j, \vec{j})$

1- أ- حدد مبيانيا  $f(0)$  و  $f(2)$

ب-حدد مبيانيا العدد  $a$  بحيث  $f(a) = 1$


ج-بين ان صيغة الدالة  $f$  هي

2- نعتبر الدالة  $g$  الخطية المعرفة بـ

أ- انقل الشكل جانبه على ورقتك ثم مثل الدالة

في نفس المعلم  $(O, i, \vec{i}, j, \vec{j})$

ب- حل مبيانيا المعادلة  $f(x) = g(x)$



دورة : يونيو 2009	2	وَعْدِ الْمَوْلَى	الْأَكَادِيمِيَّةُ الجَهُوَلِيَّةُ
	2		الْجَهُلِيَّةُ وَجْدَةُ الشَّرْقِيَّةِ

## التمرين الخامس : 2 نقط

يعطي الجدول التالي كشفا لعدد الاهداف المسجلة من طرف فريق كرة القدم خلال 30 مقابلة

4	3	2	1	0	عدد الاهداف
2	$2x$	$x$	11	5	عدد المقابلات

١- تحقق ان

2- احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة

### 3- احسب القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة


### التمرين السادس : 3 نقط

يمثل الشكل اسطوانة قائمة قطرها  $AB = 2cm$  و ارتفاعها  $h = 10cm$  و  $O$  مركز الدائرة العليا و  $O'$  مركز الدائرة السفلية

### ١- احسب $V$ حجم الاسطوانة

**ب-احسب المسافة**

2- حدد شعاع قاعدة اسطوانة لها نفس الارتفاع  $h$  و حجمها  $V'$  بحيث :



\*\*\*\*\*

## الأكاديمية الجهوية : سويس ماسة درعة

الامتحان رقم 07

## الامتحان الجهواني الموحد

## **المادة: الرياضيات**

1

مدة الاجازة: ساءة

2

3 المُهَاجِل:

**الموظف ووع**

الدورة : يونيو 2009


سلم  
التطبيق

## التمرين الأول : 3.5 نقط

- حل المعادلة :  $3(5x - 2) - 2 = 7x$

**2- حل المترابحة:**

-3 حل جبريا النظمة:

دورة : يونيو 2009		2	و	الم وث	الاكارديمية الجهوية										
		2			سوس ماسة درعة										
1	التمرin الثاني: 2 نقط	يمثل المبيان جانبه توزيع مساهمات تلاميذ احد الأقسام لمساعدة زميل لهم في شراء الأدوات المدرسية	1- حدد منوال هذه المتسلسلة الإحصائية	2- انقل و اتقم ملئ الجدول التالي :											
0.5			<table border="1"><tr><td>50</td><td></td><td></td><td>20</td><td>dh المساهمة ب</td></tr><tr><td></td><td>7</td><td>2</td><td></td><td>عدد التلاميذ</td></tr></table>	50			20	dh المساهمة ب		7	2		عدد التلاميذ		
50			20	dh المساهمة ب											
	7	2		عدد التلاميذ											
0.5	3- تحقق من أن معدل مساهمات التلاميذ هو 28	التمرin الثالث: 4 نقط	1- نعتبر الدالة التاليفية $f$ المعرفة بالصيغة التالية : $f(x) = 3x + 4$	A- احسب : $f(0)$											
0.5			B- حدد العدد الحقيقي الذي صورته بالدالة $f$ هي 1	C- انشئ التمثيل المباني ( $\Delta$ ) للدالة $f$ في معلم متعمد منظم											
1			D- لتكن $g$ الدالة الخطية التي تمثلها المباني ( $D$ ) يوازي ( $\Delta$ )	E- انشئ ( $D$ ) في نفس المعلم السابق											
1			F- حدد صيغة $g$	G- التمرin الرابع : 6 نقط											
1			H- في المستوى المنسوب لمعلم متعمد منظم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ نعتبر النقطتين $A(2, 2)$ و $B(-1, 3)$	I- هل صحيح ان النقطة $A$ تتبع المترافق ( $\Delta$ )؟											
1			J- حدد زوج احداثي المتجهة $\overrightarrow{AB}$ ثم احسب المسافة	K- انشئ $A$ و $B$ و ( $\Delta$ ) في معلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$											
1			L- حدد المعادلة المختصرة للمترافق ( $\Delta$ ) العمودي على ( $\Delta$ ) و المار من $B$	M- نعتبر الإزاحة $T$ التي تحول $O$ إلى $B$											
1			N- احسب زوجي احداثي النقطة $C$ صورة $A$ بالإزاحة $T$	O- انشئ صورة ( $\Delta$ ) بالإزاحة $T$											
1			P- التمرin الخامس : 3 نقط												
1			Q- اسطوانة قطر قاعدتها $6m$ و ارتفاعها $9m$	R- احسب حجم الاسطوانة ( $C_1$ ) تكبير ( $C_1$ ) بنسبة 2 نأخذ $\pi = 3,14$											
1			S- افترض أن $AB = 15m$ و $h = 10m$ احسب $AG$	T- افترض الان أن $AB = 15m$ و $h$ غير معلوم و أن متوازي المستطيلات مملوء بسائل											
1			U- حدد اكبر عدد صحيح قيمة $h$ لكي تكون الاسطوانة ( $C$ ) كافية لاحتواء هذا السائل.	V- التمرin السادس : 1.5 نقط											
1.5			W- توصلت إحدى دور الطالب بعدد من الكتب يفوق عدد الطلبة ب 150 كتابا و لكي يحصل كل طالب على 5 كتب وجب شراء 10 كتب إضافية	X- حدد عدد الكتب و الطلبة											

## الأكاديمية الجهوية : سوس ماسة درعة

الامتحان رقم 08

السادة: الرياضيات

مدة الإنجاز: ساعة

المعامل: 3

الدورة: يونيو 2008

التمرين الأول : 3.5 نقط

يضم نادي 25 عضوا تتوزع أعمارهم حسب الكشف التالي :

العمر	الميزة (بالسنوات)
15	14
14	13
13	12
12	11
11	10
10	6
9	5
8	4
7	5
6	3
5	2

1- حدد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية

2- احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية

3- حدد عدد الأعضاء الذين عمرهم أكبر من أو يساوي 13 سنة

التمرين الثاني: 2 نقطنعتبر الدالتين العدديتين  $f$  و  $g$  بحيث  $f(x) = \frac{3}{2}x + 9$  و  $g(x) = -3x + 9$ 1- احسب  $f(2)$  و  $g(2)$ 2- حدد العدد الذي صورته بالدالة  $g$  تساوي 53- ارسم في نفس المعلم المستقيم الممثل للدالة  $f$  و المستقيم الممثل للدالة  $g$ التمرين الثالث: 4 نقط

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x + 5y = 10 \end{cases}$$

4- حل المعادلة :  $4x^2 - 9 = 0$ التمرين الرابع : 6 نقطفي المستوى المنسوب لمعلم متعمد منمنظم  $\{O, \vec{i}, \vec{j}\}$  نعتبر النقط  $A(-2, 1)$  و  $B(1, -2)$  و  $C(2, 2)$ 1- انشئ النقط  $A$  و  $B$  و  $C$ 2- احسب المسافة  $AC$ 3- حدد احداثيي النقطة  $E$  منتصف القطعة  $[AB]$ 4- أ-تحقق من ان المعادلة المختصرة للمستقيم  $(AB)$  هي  $y = -x - 1$ ب-حدد المعادلة المختصرة للمستقيم  $(\Delta)$  واسط  $[AB]$ 5- لتكن  $C$  صورة  $D$  بالازاحة ذات المتجهة  $\overrightarrow{AB}$ أ- انشئ  $D$  في نفس المعلم  $\{O, \vec{i}, \vec{j}\}$ ب- حدد المعادلة المختصرة للمستقيم  $(CD)$ التمرين الخامس : 3 نقط $AB = 6\text{cm}$  مكعب بحيث1- احسب  $HB$ 2- احسب حجم الهرم  $HABD$

الاـكـادـيمـيـةـ الجـهـوـيـةـ	سـوـسـ مـاـسـةـ دـرـعـةـ	الـمـوـضـعـ	2	دـوـرـةـ يـونـيـوـ 2009
3- لتكن $I$ نقطة من القطعة $[HD]$ بحيث $HI = 2\text{cm}$ المستوى الموازي للمستوى $(ABD)$ و المار من $I$ يقطع $[HA]$ في $J$ و يقطع القطعة $[HB]$ في $K$ احسب مساحة المثلث $IJK$				

**التمرين السادس : 1.5 نقط**

تتـويـ شـرـكـةـ عـرـضـ آـلـاتـ منـزـلـيـةـ جـديـدـةـ لـلـبـيعـ ،ـ فـتـبـيـنـ لـهـاـ أـنـ المـصـارـيفـ الإـجـمـالـيـةـ الـيـوـمـيـةـ لـهـذـاـ عـرـضـ تـبـلـغـ 285 درـهـماـ .ـ

إـذـاـ عـلـمـتـ أـنـ الشـرـكـةـ تـرـيدـ تـحـقـيقـ رـبـحـ 40 درـهـماـ عـنـ كـلـ آـلـهـ ،ـ فـمـاـ هـوـ الحـدـ الـأـدـنـيـ (ـأـفـلـ عـدـ)ـ مـنـ الـمـبـيعـاتـ خـلـالـ سـبـعـةـ أـيـامـ لـكـيـ يـكـونـ هـذـاـ عـرـضـ مـرـبـحاـ؟ـ

\*\*\*\*\*

الـاـكـادـيمـيـةـ الجـهـوـيـةـ : سـوـسـ مـاـسـةـ دـرـعـةـ	الـاـمـتـاحـانـ رقمـ 09												
<b>الـاـمـتـاحـانـ الجـهـوـيـ المـوـحدـ</b>	<b>الـمـادـةـ الـرـيـاضـيـاتـ</b>												
<b>لنـيـلـ شـهـادـةـ السـلـكـ الـعـدـادـيـ</b>	<b>مـدـدـةـ الـإنـجـازـ سـاعـةـ</b>												
1	3												
2	الـمـهـاـمـ												
الـدـوـرـةـ يـونـيـوـ 2007	<b>الـتـمـرـينـ الـأـوـلـ :</b>												
الـمـوـضـعـ	1- حلـ المعـادـلـةـ : $3x + 1 = 2 - x$												
	2- حلـ المـتـرـاجـحةـ : $6x - 1 \leq 2x - 5$												
	3- حلـ جـبـرـياـ : $\begin{cases} x + y = 15 \\ 2x + y = 21 \end{cases}$												
	<b>الـتـمـرـينـ الثـانـيـ :</b> يـمـثـلـ الـكـشـفـ التـالـيـ مـتـسـلـسـلـةـ إـحـصـائـيـةـ :												
	<table border="1"> <tr> <td>50</td> <td>30</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>قيـمةـ الـمـيـزةـ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>الـحـصـيـصـ</td> </tr> </table>	50	30	25	20	10	قيـمةـ الـمـيـزةـ	3	7	5	4	6	الـحـصـيـصـ
50	30	25	20	10	قيـمةـ الـمـيـزةـ								
3	7	5	4	6	الـحـصـيـصـ								
	1- حـدـدـ منـوـالـ الـمـتـسـلـسـلـةـ إـلـيـ الـإـحـصـائـيـةـ .ـ												
	2- اـحـسـبـ الـمـعـدـلـ الـحـاسـبـيـ لـهـذـهـ الـمـتـسـلـسـلـةـ إـلـيـ الـإـحـصـائـيـةـ .ـ												
	<b>الـتـمـرـينـ الثـالـثـ :</b> الـمـسـطـوـيـ مـنـسـوبـ لـمـعـلـمـ مـتـعـادـ (O,I,J)ـ مـنـظـمـ نـعـتـبـ النـقـطـيـنـ (-1,2)ـ وـ (4,0)ـ Bـ وـ الـمـسـتـقـيمـ (Δ)ـ الـذـيـ مـعـادـلـتـهـ :												
	$y = -2x + 3$												
	1- أـ هلـ Aـ تـنـتـمـيـ إـلـىـ الـمـسـتـقـيمـ (Δ)ـ؟ـ هلـ Bـ تـنـتـمـيـ إـلـىـ الـمـسـتـقـيمـ (Δ)ـ؟ـ												

دورة : يونيو 2007	2 2	المـوـضـوع	الـاـكـادـيمـيـةـ الجـهـوـيـةـ سـوـسـ مـاسـةـ درـرـةـ
			بـ-حدد إحداثي منتصف القطعة $[AB]$
			جـ-احسب المسافة $AB$
			2- أـحد المعاـدةـ المختـصـرةـ لـلـمـسـتـقـيمـ $(AB)$
			بـ-بين أن المستقيمين $(AB)$ و $(\Delta)$ متـعـامـدـانـ.
			<b>الـتـمـرـينـ الـرـابـعـ :</b>
			1. دالة خطية بحيث $f(2) = 1$
			1- أـنشـيـ التـمـثـيلـ المـبـيـانـيـ لـلـدـالـلـةـ $f$ في مـلـمـ مـتـعـامـدـ مـنـظـمـ $(O,I,J)$
			2- حـدـدـ صـيـغـةـ الدـالـلـةـ $f$
			II. لـتـكـنـ $g$ الدـالـلـةـ التـالـفـيـةـ مـعـرـفـةـ بـالـصـيـغـةـ : $g(x) = \frac{1}{2}x - 2$
			1- حـدـدـ العـدـدـ الـذـيـ صـورـتـهـ بـالـدـالـلـةـ $g$ هـيـ 1
			2- أـنشـيـ التـمـثـيلـ المـبـيـانـيـ $(\Delta)$ لـلـدـالـلـةـ $g$ في نفس المـلـمـ $(O,I,J)$
			3- نـعـتـرـ الإـزـاحـةـ الـتـيـ تـحـولـ أـصـلـ المـلـمـ $O$ إـلـىـ النـقـطـةـ $A(2,-1)$
			بـيـنـ أـنـ صـورـةـ النـقـطـةـ $B(2,1)$ بـهـذـهـ الإـزـاحـةـ تـنـتـمـيـ إـلـىـ $(\Delta)$
			<b>الـتـمـرـينـ الـخـامـسـ :</b>
			هرـمـ قـاعـدـتـهـ $ABCD$ مـرـبـعـ وـارـتـقـاعـهـ $SH = 8cm$ وـ $AB = 6cm$ بـحـيثـ
			وـ لـتـكـنـ $I$ مـنـتصـفـ $[SH]$
			نزـيلـ الـهـرـمـ $IABCD$ مـنـ الـهـرـمـ $SABCD$ وـ نـحـصـلـ عـلـىـ مجـسـمـ $(P)$
			1- اـحـسـبـ حـجـمـ المـجـسـمـ $(P)$
			2- بـيـنـ أـنـ المجـسـمـ $(P)$ تصـغـيرـ بـنـسـبـةـ $\frac{1}{10}$ لمـجـسـمـ أـصـلـيـ حـجـمـهـ المـجـسـمـ $48000 cm^3$

\*\*\*\*\*

## الـاـكـادـيمـيـةـ الجـهـوـيـةـ : دـكـالـةـ عـبـدـةـ

الـامـتـحـانـ رـقـمـ 10

1

2

## الـامـتـحـانـ الجـهـوـيـ المـوـحدـ لنـيـلـ شـهـادـةـ السـلـكـ الـعـدـادـيـ

الـسـمـادـةـ:

الـرـيـاضـيـاتـ

مـدـةـ الـإنـجاـزـ: سـاعـةـ 1ـانـ

الـمـهـاـمـ:

الـدـوـرـةـ: يـونـيـوـ 2007

## الـمـوـضـوعـ

**الـتـمـرـينـ الـأـوـلـ : 5ـنـقـطـ**

1- حل المعادلتين التاليتين :  $\frac{2x}{3} - \frac{5}{6} = x - \frac{3}{2}$

2- حل المتراجحة :  $2 - 3x > x + 7$

3- حل النـظـمـةـ التـالـيـةـ :  $\begin{cases} 3x + 5y = 72 \\ x + y = 20 \end{cases}$

واجب زيارة أحد المتاحف هو 3 دراهم للأطفال و 5 دراهم للكبار . أدى فوج متكون من 20 زائراً لزيارة هذا المعرض مبلغ 72 درهماً لزيارة المتحف . ما هو عدد الأطفال و عدد الكبار في الفوج المذكور .

دورة : يونيو 2007

2

2

المـوـضـوع

الاـكـادـيمـيـةـ الجـهـوـيـ

دـكـالـةـ عـبـدـةـ

التمرين الثاني : 5 نقط1- لتكن  $f$  دالة خطية بحيث:  $f(2) = 3$ (a) حدد معامل الدالة  $f$ (b) احسب  $f(-3)$ (c) حدد العدد الذي صورته  $\frac{-3}{5}$  بالدالة  $f$ 2- نعتبر الدالة التالية  $g$  بحيث  $g(x) = 2x + 3$ (a) احسب  $g(0)$  و  $g(-1)$ (b) أنشئ التمثيل المباني للدالة  $g$  في معلم متعمد و منظم  $(O, I, J)$ .التمرين الثالث : 5 نقط

يضم نادي للسباحة 25 منخرطاً موزعين حسب أعمارهم وفق الجدول التالي:

العمر (سن)	17	16	15	14	13	12
الصيص	4	8	1	7	3	2
الصيص المترافق						

1) اتمم الجدول و حدد المنوال؟

2) ما هو العمر المتوسط للمنخرطين؟

3) احسب القيمة الوسطية.

التمرين الرابع : 5 نقطنعتبر في معلم متعمد و منظم  $(O, I, J)$  المستقيمين  $y = 3x - 1$  و  $y = \frac{-1}{3}x$ 1- بين أن  $(D)$  و  $(D')$  متعمدان2- حدد المعادلة المختصرة للمستقيم  $(\Delta)$  الموازي للمستقيم  $(D)$  و المار من النقطة  $A(2, -2)$ .التمرين الخامس : 5 نقطنعتبر في معلم متعمد و منظم  $(O, I, J)$  النقط  $G(-2, -3)$ ;  $F(2, 5)$ ;  $E(6; 3)$  الدائرة  $(C)$  التي احد اقطارها  $[EG]$ 1- مثل النقط  $G$ ;  $F$ ;  $E$ ;2- حدد إحداثيتي  $H$  النقطة مركز الدائرة  $(C)$ 3- احسب شعاع الدائرة  $(C)$ 4- نعتبر الإزاحة  $T$  التي تحول  $E$  إلى  $F$  و  $(C)$  صورة الدائرة  $(C)$  بالإزاحة  $T$ أ- حدد شعاع  $(C')$ ب- حدد إحداثيتي  $H'$  مركز  $(C')$  ثم أنشئها.التمرين السادس : 5 نقطABCDEGFGH متوازي مستطيلات بحيث  $ABCD$  مربع و  $BF = 3cm$ ;  $AB = 4cm$ 1- أ- احسب  $CH$ ب- احسب حجم الهرم  $HABCD$ 2-  $HA'B'C'D'$  هو تكبير للهرم  $HABCD$  بحيث مساحة المربع  $A'B'C'D'$  تساوي  $48cm^2$  احسب معامل التكبير  $k$

## الأكاديمية الجهویة : مراكش تانسيفت الحوز

الامتحان رقم 11

1

2

الامتحان الجهوی الموحد  
لنيل شهادة السلك الاعدادي

السادة: الرياضيات

مدة الاجازة: ساعة وان

المهام:

ال موضوع

الدورة: يونيو 2007

التمرين الأول : 5 نقط

1- حل المعادلين التاليين :  $3(x - 2) + 5x = 10$

2- حل المتراجحة :  $4x + 7 < 2x - 5$

3- a - حل النظمة التالية :  $\begin{cases} x + y = 14 \\ x + 4y = 32 \end{cases}$

b - وزع تاجر 4 كيلوغرامات من الشاي في علب من صنف 125 غرام و من صنف 500 غرام  
إذا علمت أن عدد العلب هو 14 فحدد عدد علب كل صنف .التمرين الثاني : 4 نفي المستوى المنسوب لمعلم متعمد منظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  نعتبر النقطتين  $A(1, 2)$  و  $B(5, 0)$ 

(1)


(a) حدد المعادلة المختصرة لل المستقيم  $(AB)$ (b) تحقق من ان المعادلة المختصرة لل المستقيم  $(OA)$  هي  $y = 2x$ (c) استنتج ان  $(AB)$  و  $(OA)$  متعمدان(2) انشئ النقطتين  $A$  و  $B$  و المستقيمين  $(AB)$  و  $(OA)$ (3) حدد احداثي النقطة  $C$  بحيث تكون  $A$  منتصف القطعة  $[BC]$ التمرين الثالث : 4 نفي الشكل جانبه ،  $(D)$  هو التمثيل المباني للدالة التاليفية $f$  و  $(D')$  هو التمثيل المباني للدالة الخطية  $g$ 

1- باستعمال التمثيل المباني جانبه

(a) حدد  $f(-2)$  و  $f(0)$ (b) قارن  $f(-1)$  و  $g(-1)$ 2- حدد  $f(x)$  لكل عدد حقيقي  $x$ 

3- اتمم الجدول التالي :

$x$	-4		-10
$g(x)$		3	



دورة : يونيو 2007	2 2	الموضوع	الأكاديمية الجهوية مراكش تانسيفت الحوز
-------------------	--------	---------	---

التمرين الرابع : 2 نمتوازي أضلاع مركزه  $I$   $ABCD$ 1- حدد صورة  $D$  بالإزاحة ذات المتجهة  $\overrightarrow{AB}$ 2- أنشئ  $M$  و  $N$  صورتي  $B$  و  $D$  على التوالي بالإزاحة ذات المتجهة  $\overrightarrow{AI}$ 3- بين أن  $M$  و  $N$  و  $C$  نقط مستقيميةالتمرين الخامس : 2 ن

نظمت اللجنة الثقافية لإحدى الإعداديات رحلة إلى مدينة الصويرة .

الجدول التالي يعطي توزيعاً للتلاميذ المشاركين في هذه الرحلة حسب أعمارهم .

الميزة : العمر بالسنوات	16	15	14	13	12	11	50
الحصص : عدد التلاميذ	10	5	10	5	15	5	25
الحصص المترافق							


1- حدد منوال هذه المتسلسلة

2- اتمم ملئ الجدول

3- احسب معدل أعمار التلاميذ المشاركين في هذه الرحلة

التمرين السادس : 3 ن

( )  $ABCDEFGH$  متوازي المستطيلات بحيث  $AB = 12cm$  و  $AD = 3cm$  و  $DH = 6cm$  و لتكن  $M$  منتصف  $[DC]$  انظر الشكل

1- احسب حجم رباعي الأوجه  $EADM$ 2- احسب المسافة  $AM$ 3- احسب المسافة  $ME$ 

\*\*\*\*\*

# الأكاديمية الجهویة : مكناس تافيلالت

الامتحان رقم 12

1

2

## الامتحان الجهوی الموحد لنيل شهادة السلك الاعدادي

الساعة: ٣

مدة الاجازة: ساعتان

المهام: 3

الموعد: ٢٠٠٧ يونيو

التمرين الأول : 5 نقط

1- حل المعادلتين التاليتين :

$$A - \frac{x-1}{3} + \frac{x+1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$B - x^2 - \frac{1}{4} = 0$$

2- حل المترابحة :  $-5x + 3 < 0$

3- يحتوي كيس على صنفين من الكرات مجموعها 45 . عدد الصنف الأول يساوي ثلثي عدد الصنف الثاني .  
حدد عدد كرات كل صنف .

التمرين الثاني : 4 ن

في المستوى المنسوب لمعلم متعمد منظم نعتبر النقط (A; 2; 5) (B; 1; 2) (C; -1; 4) و (D; 0; 3) الذي معادلته المختصرة هي :  $y = -x + 3$

1- تحقق من ان B تنتمي الى المستقيم (D) و ان النقطة A لا تنتمي الى (D)

2- بين ان I منتصف القطعة  $[BC]$

3- احسب المسافتين AB و AC و استنتج ان المثلث ABC متساوي الساقين

4- اكتب المعادلة المختصرة للمستقيم ( $\Delta$ ) العمودي على (D) و المار من I

التمرين الثالث : 2 ن

نعتبر المتسلسلة الاحصائية الممثلة بالجدول التالي :

قيمة الميزة	20	16	12	8	4
الحصصيات	6	5	4	3	2

1- احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة.

2- احسب القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة.

التمرين الرابع : 4 ن

1- لتكن الدالة التاليفية المعرفة بما يلي :  $f(x) = 3x - 5$

أ- أنشئ في معلم متعمد و منظم التمثيل المباني للدالة التاليفية  $f$

ب- حدد قيمة العدد  $a$  بحيث تكون النقطة  $P(a; -1)$  تنتمي إلى التمثيل المباني للدالة التاليفية  $f$

2- لتكن  $g$  دالة خطية بحيث :  $g\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{4}{3}$

حدد  $(x)$   $g$  بدلالة  $x$ .

التمرين الخامس : 2 ن

ليكن  $ABCD$  مربعا مركزه النقطة  $O$  نعتبر الإزاحة  $T$  التي تحول النقطة  $A$  إلى النقطة  $B$

1- أنشئ الشكل

2- حدد صورة النقطة  $D$  بالإزاحة  $T$

دورة : يونيو 2007	2	الـ وـ عـ	الأكاديمية الجهوية مكناس تافيلالت
	2		
3- لتكن النقطة $E$ صورة النقطة $O$ بالإزاحة $T$ بين أن المستقيمين $(EB)$ و $(EC)$ متعمدان			
<b>التمرين السادس : 3 ن</b>			

## الاًكاديمية الجھوية : فاس بولمان

الامتحان رقم 13

1  
2

## الامتحان الجهو<sup>ي</sup> المودع لليل شهادة السالك الـ عداد<sup>ي</sup>

## الوحدة: الرياضيات

مدة الإنجاز: ساءة

3 المُعَامَل:

الموظفون

الدورة : يونيو 2006

التمرين الأول : 3 ن

يمثل الجدول التالي توزيع تلاميذ احد الأقسام حسب قاماتهم ب cm

153	152	151	150	القامة ب cm
5	6	7	2	عدد التلاميذ

- 1- ما هو منوال هذا التوزيع؟ على جوابك
  - 2- حدد القيمة الوسطية لهذا التوزيع.
  - 3- احسب معدل قامات تلاميذ هذا القسم.

## التمرين الثاني : 7 ن

2- لاحظ احمد أن ثمن مسطرتين في متجر يفوق ثمن بركار بدرهم واحد ، و ثمن ثلاثة مسطرات يساوي ثمن بركارين ليكن  $x$  ثمن مسطرة واحدة و  $y$  ثمن بركار واحد

- A- بين أن النقطة  $(S)$  تعبر عن هذه المعطيات
- B- استنتج ثمن المسطرة و ثمن البركار

- حل جبريا النظمة التالية :  
$$(S) : \begin{cases} 2x - y - 1 = 0 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$$

2- لاحظ احمد أن ثمن مسطرتين في متجر يفوق ثمن بركار بدرهم واحد ، و ثمن ثلاثة مسطرات يساوي ثمن بركارين ليكن  $x$  ثمن مسطرة واحدة و  $y$  ثمن بركار واحد

A- بين أن النقطة  $(5)$  تعبر عن هذه المعطيات

أ- بين أن النظمة (S) تعبر عن هذه المعطيات

ب- استنتج ثمن المسطرة و ثمن البركار

3- نعتبر الدالة التاليفية  $f$  و الدالة الخطية  $g$  بحيث  $f(x) = 2x - 1$  و  $g(x) = \frac{3}{2}x$

أ- احسب

بـ- مثل في معلم متعمد وممنظم الدالتين  $f$  و  $g$

جـ حل مبانـا النـظـمة (S)

الاکاديمية الجھویة فاس بولمان	الموضوع	وع	2	دوره : يونيو 2006
			2	

**التمرين الثالث : 4 ن**

في المستوى المنسوب لمعلم متعمد منظم  $(\vec{O}, \vec{i}, \vec{j})$  نعتبر النقطتين  $A(-1; -3)$  و  $B(2; 1)$  والمستقيم  $(D)$  الذي معادلته هي  $x - 2y - 4 = 0$  :

1- أ- احسب  $AB$

ب- حدد زوج احداثي  $E$  منتصف القطعة  $[AB]$

2- أ- اوجد المعادلة المختصرة للمستقيم  $(D)$

ب- حدد المعادلة المختصرة للمستقيم  $(\Delta)$  المار من  $A$  و الموازي ل  $(D)$

ج- ليكن  $(L)$  المستقيم الذي معادلته  $y = 2x - 3$  هل  $(L)$  و  $(D)$  متعمدان ؟ علل جوابك

**التمرين الرابع : 3 ن**

متلث قائم الزاوية في  $A$  و  $T$  هي الإزاحة التي تحول النقطة  $B$  إلى  $C$

1- أنشئ النقطة  $D$  صورة  $A$  بالإزاحة  $T$

2- نعتبر النقطة  $E$  مماثلة النقطة  $B$  بالنسبة ل  $C$ . بين أن  $E$  هي صورة  $C$  بالإزاحة  $T$ .

3- بين أن المستقيمين  $(CD)$  و  $(DE)$  متعمدان .

**التمرين الخامس : 3 ن**

مكعب طول حرفه  $9cm$

1- احسب  $AH$

2- بين أن حجم الهرم  $ACDH$  يساوي  $121,5cm^3$ :

3- لتكن  $M$  نقطة من  $[AH]$  حيث  $AM = \frac{1}{3}AH$

المستوى المار من  $M$  و الموازي ل  $(CDH)$  يقطع  $[AD]$  و  $[AC]$  على التوالي في النقطتين  $N$  و  $P$

احسب حجم الهرم :

\*\*\*\*\*

الاکاديمية الجھویة : دکاله عبدة

الامتحان رقم 14

1

2

الامتحان الجھوی الموحد  
لنيل شهادة السالك الاعدادي

السادة: الرياضيات

مدة الاجاز: ساءة

المهام: 3

الموضوع

الدوره: يونيو 2006

**التمرين الأول : 3 نقط**

$$\begin{cases} 2x + 5y = 61 \\ x + y = 20 \end{cases}$$

2- يتوفى احمد على 61 درهماً موزعة على 20 قطعة نقدية بعضها من فئة درهمين ، و البعض الآخر من فئة خمسة دراهم . احسب عدد النقدية من كل فئة

دورة : يونيو 2007	2	الموضوع						الأكاديمية الجهوية مكناس تافيلالت								
	2															
<b>التمرين الثاني : 3 نقط</b>																
يقدم الجدول التالي مبيعات احدى متاجر الهاتف المحمولة وذلك حسب اثمانها :																
1000	900	800	700	600	500			ثمن الهاتف بالدرهم								
4	6	3	4	3	5			عدد المبيعات (الحصيص)								
								الحصيص المترافق								
1- اتمم الجدول 2- حدد منوال هذه المتسلسلة 3- احسب القيمة الوسطية 4- احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة																
<b>التمرين الثالث : 4 نقط</b>																
1- أ- اوجد الدالة $f$ الخطية التي يمر ثمتلها المبيانى من النقطة : $M(3;4)$ ب- اوجد الدالة $g$ التالية التي معاملها 2 و التي تحقق $-2 = g(-2)$																
2- نعتبر الدالتين $f$ و $g$ المعرفتين بما يلي : $f(x) = \frac{4}{3}x + 2$ و $g(x) = 2x + 2$																
أ- احسب $f\left(\frac{1}{2}\right) - g\left(-\frac{1}{2}\right)$ ب- ما هو العدد الذي صورته هي 2 بالدالة $g$ ؟ 3- أ- أنشئ التمثيل المبيانى للدالة $f$ و للدالة $g$ في معلم متعامد منظم $(O, I, J)$ ب- أقرأ في التمثيل المبيانى للعدد الذي له نفس الصورة بالدالة $f$ و بالدالة $g$																
<b>التمرين الرابع : 4 نقط</b>																
(Mعلم متعامد منظم نعتبر النقطتين $A(-2,3)$ و $B(6,-1)$ )																
1- أ- احسب إحداثي النقطة $M$ منتصف القطعة $[AB]$																
ب- تتحقق أن المعادلة المختصرة للمستقيم $(AB)$ هي : $y = -\frac{1}{2}x + 2$																
2- أ- نسمى $(\Delta)$ واسط القطعة $[AB]$ تتحقق أن المعادلة المختصرة للمستقيم $(\Delta)$ هي $y = 2x - 3$																
ب- تأكد أن $(\Delta)$ يمر من $P(0;-3)$																
3- أ- احسب إحداثي النقطة $Q$ علما أن $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{BP}$																
ب- تتحقق أن $AB = PQ$ ثم استنتج أن $APBQ$ مربع .																
<b>التمرين الخامس : 3 نقط</b>																
معين مركزه $I$ و $T$ هي الإزاحة التي تحول النقطة $A$ إلى $B$																
1- أ- تأكد أن صورة $D$ بالإزاحة $T$ هي $C$																
ب- أنشئ النقطة $J$ صورة $I$ بالإزاحة $T$																
3- أ- حدد صورة الزاوية $\hat{AID}$ بالإزاحة $T$																
ب- استنتاج أن المثلث $BJC$ قائم الزاوية																
4- لتكن النقطة $K$ بحيث : $\overrightarrow{DK} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}$																
أ- بين أن : $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{DC}$																
ب- استنتاج أن $K$ هي صورة $B$ بالإزاحة $T$																

**التمرين السادس : 3 نقط**

في الشكل  $ABCD$  مربع مركزه  $O$ . الهرم الذي قاعدته  $ABCD$  و رأسه  $S$  و ارتفاعه  $[SO]$  بحيث

$$SA = 5\text{cm} \quad AB = 3\sqrt{2}\text{cm}$$

1- أتحقق ان  $OA = 3\text{cm}$


ب-استنتج ان  $SO = 4\text{cm}$

ج-احسب مساحة المربع  $ABCD$  ثم احسب حجم الهرم  $SABCD$

2- نقطع الهرم  $SABCD$  بمستوى يوازي القاعدة و يمر من  $A'$  فنحصل على الهرم  $SA'B'C'D'$  الذي يمثل تصغير للهرم  $SABCD$

أ- حدد نسبة التصغير  $k$

ب- استنتاج مساحة المربع  $A'B'C'D'$  و حجم الهرم  $A'B'C'D'$



\*\*\*\*\*

**الأكاديمية الجهوية : سوس ماسة درعة****الامتحان رقم 15**

1	الإمتحان الجهوي الموحد	المادة: الرياضيات
2	لليل شهادة السلك العدائي	مدة الإنجاز: ساعتان
	الموسم	المواعيد: 3 يونيو 2006

**التمرين الأول : 2 ن**

حل جبريا النظمة التالية :

$$\begin{cases} 2x - 3y = 11 \\ 4x + y = 15 \end{cases}$$
**التمرين الثاني: 5,5 ن**

لتكن  $f$  الدالة التالية معرفة بالصيغة :  $f(x) = 3x - 2$

1- أ- احسب  $f(1)$

ب- هل النقطتان  $A(0,2)$  و  $B\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$  تنتهيان إلى  $(\Delta)$  التمثيل المباني ل  $f$  ؟

ت- أنشئ  $(\Delta)$  في معلم متعمد منظم  $(O, I, J)$

2- و دالة خطية تمثلها المباني يقطع  $(\Delta)$  في  $B$

أ- مثل مبيانا  $g$  في نفس المعلم  $(O, I, J)$

ب- حدد صيغة  $g$

**التمرين الثالث: 4 ن**

المستوى منسوب لمعلم متعمد  $(O, I, J)$  منظم نعتبر النقط  $A(-1,3)$  و  $B(4,-2)$  و  $C(2,4)$

1- حدد احداثي المتجهة  $\overrightarrow{AB}$  و احسب المسافة

2- حدد إحداثي النقطة  $I$  منتصف  $[AB]$ 

دورة : يونيو 2006	2	الموعد	الأكاديمية الجهوية سوس ماسة درعة
	2		

3- تحقق أن  $\frac{5\sqrt{2}}{2} = CI$  و استنتج طبيعة المثلث  $ABC$

**التمرين الرابع : 2.5 ن**

مثلث قائم الزاوية في  $A$  بحيث  $AB = 2$  و  $BC = 4$  ولتكن  $I$  منتصف  $[BC]$  والإزاحة  $T$  التي مجدها  $\overrightarrow{AI}$

1- ما هي صورة  $A$  بالإزاحة  $T$  ؟

ب- أنشئ  $D$  صورة  $B$  بالإزاحة  $T$

2- بين أن المثلث  $BDI$  متساوي الأضلاع

**التمرين الخامس : 3 ن**

يتكون ناد من 20 فردا توزع أعمارهم كالتالي :

30 - 38 - 30 - 18 - 24 - 22 - 17 - 24 - 28 - 30 - 22  
24 - 28 - 22 - 30 - 18 - 37 - 18 - 24 - 29 - 22

1- أعط جدول الحصصيات

2- بين أن المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية هو 25

3- التحق مؤخرا منخرط جديد بالنادي . حدد سن هذا المنخرط إذا علمت أن المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية لم يتغير .


**التمرين السادس : 3 ن**

هرم منتظم قاعدته المربع  $ABCD$  الذي مركزه  $O$  نضع  $SA = SB = SC = SD = 5$  و  $AB = 3\sqrt{2}$

1- بين أن الارتفاع  $SO$  يساوي 4

2- لتكن  $A'$  و  $B'$  و  $C'$  و  $D'$  منتصفات القطع  $[SA]$  و  $[SB]$  و  $[SC]$  و  $[SD]$  على التوالي

احسب حجم المجسم  $ABCDA'B'C'D'$



\*\*\*\*\*

2- أ- لنبيان أن  $y = \frac{2}{3}x + 1$  هي معادلة مختصرة للمسقطيم  $(AB)$

لنحدد المعادلة المختصرة ل  $(AB)$  :  
 $(AB) : y = mx + p$   
 لنصع :  $m$

ولبما أن  $B \in (AB)$  و  $A \in (AB)$  :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$m = \frac{-1 - 3}{-3 - 3}$$

$$m = \frac{-4}{-6} = \frac{2}{3}$$

( $AB$ ) :  $y = \frac{2}{3}x + p$  ومنه :

لنحدد  $p$ :

ولبما أن  $A \in (AB)$  :

$$y_A = \frac{1}{2}x_A + p$$

$$\text{يعني: } 3 = \frac{2}{2} \times 3 + p$$

$$\text{يعني: } 3 = 2 + p$$

$$\text{يعني: } p = 3 - 2 = 1$$

$$\text{اذن: } y = \frac{2}{3}x + 1$$

ب- استنتاج المعادلة المختصرة  $(\Delta)$  لـ  $(AB) \perp (\Delta)$

لدينا ؛

( $AB$ ) :  $y = \frac{2}{3}x + 1$  و لدينا :

( $\Delta$ ) :  $y = m'x + p'$

$$\text{يعني: } \frac{2}{3} \times m' = -1$$

$$\text{يعني: } m' = \frac{-1}{\frac{2}{3}} = -1 \times \frac{3}{2} = -\frac{3}{2}$$

$$\text{يعني: } (\Delta) : y = -\frac{3}{2}x + p'$$

لنحدد  $p'$

ولبما أن  $C \in (AB)$  :

$$\text{يعني: } y_C = -\frac{3}{2}x_C + p'$$

$$\text{يعني: } 1 = -\frac{3}{2} \times 2 + p'$$

$$\text{يعني: } 1 = -3 + p'$$

$$\text{اذن: } 4 = p'$$

$$\text{و بال التالي: } (\Delta) : y = -\frac{3}{2}x + 4$$

### تصحيح الامتحان 01 جهة سوس ماسة درعة يونيو 2011

#### التمرين الأول

1- لنحل المعادلة :  $3x + 1 = x - 2$

لدينا :  $3x + 1 = x - 2$

يعني :  $3x - x = -2 - 1$

يعني :  $2x = -3$

اذن :  $x = -\frac{3}{2}$

وبالتالي : للمعادلة حل وحيد هو  $-\frac{3}{2}$

2- لنحل المترابحة :  $2x - 1 \geq x + 1$

لدينا :  $2x - 1 \geq x + 1$

يعني :  $2x - x \geq 1 + 1$

يعني :  $x \geq 2$

اذن : حلول المعادلة هي جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من أو يساوي 2

#### التمرين الثاني:

1- لنحدد منوال المتسلسلة الإحصائية.

لدينا اكبر حصص هو 5 الموافق لقيمة الميزة 3

اذن المنوال هو 3

2- لنحسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية.

$$M = \frac{2 \times 3 + 3 \times 5 + 4 \times 2 + 5 \times 4}{14}$$


$$M = \frac{6 + 15 + 8 + 20}{14}$$

$$M = \frac{49}{14}$$

$$M = 3,5$$

#### التمرين الثالث:

1- أ- أنشئ  $(AB)$  علماء أن  $A(3,3)$  و  $B(-3,-1)$



(AB) :  $3y = 2x + 3$  يعني :

(AB) :  $2x - 3y = -3$  يعني :

و بالتالي نقطة تقاطع (AB) و ( $\Delta$ ) هي حل النظمة

$$\begin{cases} 2x - 3y = -3 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$$

ادن احداثي نقطة تقاطع (AB) و ( $\Delta$ ) هما :  $\left(\frac{18}{13}; \frac{25}{13}\right)$

#### التعريف الرابع:


- 1- تمثيل الدالة  $f$

لدينا :  $f$  دالة خطية يعني ان تمثيلها سيمثل من اصل المعلم

$$f(2) = 1$$

يعني : ان تمثيل الدالة  $f$  يمثّل من النقطة  $M(2; 1)$

وبالتالي تمثيل الدالة هو المستقيم  $(OM)$



بـ لدينا  $f$  دالة خطية

$$f(x) = ax$$

$$a = \frac{f(x)}{x}$$

$$a = \frac{f(2)}{2}$$

$$a = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x$$

2- لتحقق من أن النقطة  $E$  تتنمي إلى  $(D)$

$$f(x_E) = y_E \text{ يعني: } E \in (D)$$

$$\frac{1}{2} \times 4 = 2$$

$$2 = 2$$

وبالتالي:  $E$  تحقق المعادلة

$$E \in (D)$$

$$\begin{cases} 2x - 3y = -3 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases} \quad 3- \text{أـ الحل النظمة:}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y = -3 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases} \quad \text{لدينا:}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y = -3 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \times(3) \\ \times(2) \end{array} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} 6x - 9y = -9 \\ 6x + 4y = 16 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

نطرح السطر الثاني من الأول :

$$6x - 9y - (6x + 4y) = -9 - 16$$

$$6x - 9y - 6x - 4y = -25$$

$$-13y = -25 \quad \text{يعني:}$$

$$y = \frac{-25}{-13} = \frac{25}{13} \quad \text{يعني:}$$

نعرض  $y$  بقيمة في إحدى المعادلتين الأصلتين :

$$2x - 3 \times \frac{25}{13} = -3$$

$$2x - \frac{75}{13} = -3$$

$$2x = -3 + \frac{75}{13}$$

$$2x = \frac{36}{13}$$

$$x = \frac{18}{13}$$

$$\text{اذن: } x = \frac{18}{13}$$

$$\left(\frac{18}{13}; \frac{25}{13}\right) \text{ هو حل النظمة}$$

بـ بما ان  $(\Delta) \perp (AB)$

و  $C \in (\Delta)$

يعني ان المسقط العمودي ل  $C$  على هو نقطة تقاطع  $(AB)$  و  $(\Delta)$

$$\text{لدينا: } (\Delta) : y = -\frac{3}{2}x + 4$$

$$(\Delta) : 2 \times y = 2 \times \left(-\frac{3}{2}x + 4\right) \quad \text{يعني:}$$

$$(\Delta) : 2y = -3x + 8$$

$$(\Delta) : 3x + 2y = 8 \quad \text{يعني:}$$

$$(AB) : y = \frac{2}{3}x + 1 \quad \text{ولدينا:}$$

$$(AB) : 3 \times y = 3 \times \left(\frac{2}{3}x + 1\right) \quad \text{يعني:}$$

يعني :  
 $3 = 0 + b$   
 ادن :  
 $3 = b$

$$g(x) = \frac{1}{2}x + 3 \quad \text{و بالتالي :}$$

### التمرين الخامس :

1- لحساب حجم الهرم

$$V_{AEFGH} = \frac{1}{3} \times AE \times S_{EFGH} \quad \text{لدينا :}$$

$$V_{AEFGH} = \frac{1}{3} \times AE \times EF \times FG \quad \text{يعني :}$$

$$V_{AEFGH} = \frac{1}{3} \times 4 \times 6 \times 3 \quad \text{يعني :}$$

$$V_{AEFGH} = 24 \text{ cm}^3 \quad \text{ادن :}$$

2 - أ- لدينا :  $(EFG)$  يوازي  $(I JL)$

و لدينا  $AI = 6 \text{ cm}$  و  $AE = 4 \text{ cm}$

$$\frac{AI}{AE} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \quad \text{يعني :}$$

ادن : الهرم  $A IJKL$  هو تكبير للهرم  $A EFGH$  نسبته  $\frac{3}{2}$

ب - بما ان الهرم  $A IJKL$  هو تكبير للهرم  $A EFGH$  نسبته

$$\frac{3}{2}$$


$$\frac{IL}{EH} = \frac{3}{2} \quad \text{و} \quad \frac{IJ}{EF} = \frac{3}{2} \quad \text{يعني ان :}$$

$$\frac{IL}{3} = \frac{3}{2} \quad \text{و} \quad \frac{IJ}{6} = \frac{3}{2} \quad \text{يعني ان :}$$

$$IL = \frac{3}{2} \times 3 \quad \text{و} \quad IJ = \frac{3}{2} \times 6 \quad \text{يعني ان :}$$

$$IL = 4,5 \text{ cm} \quad \text{و} \quad IJ = 9 \text{ cm} \quad \text{يعني ان :}$$

ادن بعده المستطيل  $IJKL$  هما  $4,5 \text{ cm}$  و  $9 \text{ cm}$



3 - لنحدد احداثي النقطة  $G$   
 لدينا  $E$  منتصف لـ  $[GF]$

$$\begin{cases} \frac{x_G + x_F}{2} = x_E \\ \frac{y_G + y_F}{2} = y_E \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} \frac{x_G + 2}{2} = 4 \\ \frac{y_G + 4}{2} = 2 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} x_G + 2 = 4 \times 2 \\ y_G + 4 = 2 \times 2 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} x_G + 2 = 8 \\ y_G + 4 = 4 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} x_G = 8 - 2 \\ y_G = 4 - 4 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} x_G = 6 \\ y_G = 0 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

ادن :  $G(6;0)$

4 - لدينا  $E$  منتصف لـ  $[GF]$

يعني :  $\overrightarrow{GE} = \overrightarrow{EF}$   
 ادن النقطة  $E$  هي صورة النقطة  $G$  بالإزاحة

5 - أ- لدينا :  $F(2;4) \in (D')$

و بما أن  $g$  الدالة التالية التي تمثلها المبيانى هو المستقيم  $(D')$

$$g(2) = 4 \quad \text{فإن :}$$

ب - لنحدد صيغة  $g$

$$g(2) = 4 \quad \text{لدينا :}$$

$$g(0) = 3 \quad \text{ولدينا مبيانيا :}$$

لنسع :  $g(x) = ax + b$

$$a = \frac{g(2) - g(0)}{2 - 0} \quad \text{يعني :}$$

$$a = \frac{4 - 3}{2 - 0} \quad \text{يعني :}$$

$$a = \frac{1}{2} \quad \text{يعني :}$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x + b \quad \text{و منه :}$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x + b \quad \text{و منه :}$$

$$g(0) = \frac{1}{2} \times 0 + b \quad \text{يعني :}$$

4- ليكن  $x$  هو عدد الأطفال و  $y$  عدد الكبار

$$\begin{cases} 3x + 7y = 290 \\ x + y = 50 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 3x + 7y = 290 \\ x = 50 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 3(50 - y) + 7y = 290 \\ x = 50 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 150 - 3y + 7y = 290 \\ x = 50 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 4y = 140 \\ x = 50 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} y = \frac{140}{4} = 35 \\ x = 50 - y = 50 - 35 = 15 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

ادن عدد الاطفال هو 15 و عدد الكبار هو 35

### التمرين الثاني

-1

5	4	3	2	1	الميزة
2	6	10	4	3	الحصيص

-2 المنوال

لدينا : اكبر حصيص 10 موافق لقيمة 3

ادن المنوال هو 3

-3- المعدل الحسابي :

$$M = \frac{3 \times 1 + 2 \times 4 + 3 \times 10 + 4 \times 6 + 5 \times 2}{25} \quad \text{لدينا :}$$

$$M = \frac{3 + 8 + 30 + 24 + 10}{25} \quad \text{يعني :}$$

$$M = \frac{75}{25} \quad \text{يعني :}$$

$$M = 3 \quad \text{ادن :}$$

-4- القيمة الوسطية :

5	4	3	2	1	الميزة
2	6	10	4	3	الحصيص
25	23	17	7	3	المترافق

لدينا نصف الحصيص الاجمالي هو :  $\frac{25}{2} = 12,5$

و انطلاقا من جدول الحصصيات المترافقه الحصيص المترافق الاكبر مباشرة من 12,5 هو 17 الموافق لقيمة الميزة

3

ادن القيمة الوسطية هي 3

### تصحيح الامتحان 02

جهة تادلا ازيلال يونيو 2010

#### التمرين الأول

$$14x - 4 = 11 - x \quad \text{لحل المعادلة:}$$

$$14x + x = 11 + 4 \quad \text{يعني :}$$

$$15x = 15 \quad \text{يعني :}$$

$$x = \frac{15}{15} \quad \text{يعني :}$$

$$x = 1 \quad \text{يعني :}$$

ادن حل المعادلة الوحيد هو 1

$$(x - 1)^2 + (3x + 5)(x - 1) = 0 \quad \text{لحل المعادلة :}$$

$$(x - 1) \times (x - 1) + (3x + 5)(x - 1) = 0 \quad \text{يعني :}$$

$$(x - 1) \times [(x - 1) + (3x + 5)] = 0 \quad \text{يعني :}$$

$$(x - 1) \times [x - 1 + 3x + 5] = 0 \quad \text{يعني :}$$

$$(x - 1) \times [4x + 4] = 0 \quad \text{يعني :}$$

$$x - 1 = 0 \quad \text{أو } 4x + 4 = 0 \quad \text{يعني :}$$

$$x = 1 \quad \text{أو } 4x = -4 \quad \text{يعني :}$$

$$x = \frac{-4}{4} = -1 \quad \text{أو } x = 1 \quad \text{يعني :}$$

ادن للمعادلة حلان هما 1 و -1

$$3x + 1 \leq 9 - x \quad \text{لحل المتراجحة :}$$

$$3x + x \leq 9 - 1 \quad \text{يعني :}$$

$$4x \leq 8 \quad \text{يعني :}$$

$$x \leq \frac{8}{4} \quad \text{يعني :}$$

$$x \leq 2 \quad \text{يعني :}$$

ادن حلول المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقة الأصغر من أو يساوي 2

$$2x - 3y = 4 \quad \text{لحل النظمة التالية :}$$

$$x + y = 2 \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y = 4 \\ x = 2 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 2(2 - y) - 3y = 4 \\ x = 2 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 4 - 2y - 3y = 4 \\ x = 2 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} -5y = 4 - 4 = 0 \\ x = 2 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} y = 0 \\ x = 2 - y = 2 - 0 = 2 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

و بالتالي حل النظمة هو الزوج : (2;0)

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \quad \text{لدينا :}$$

$$AB = \sqrt{(2-0)^2 + (0-3)^2} \quad \text{يعني :}$$

$$AB = \sqrt{4+9} \quad \text{يعني :}$$

$$AB = \sqrt{13} \quad \text{ادن :}$$

ج- لنبين ان :  $y = -\frac{3}{2}x + 3$  هي معادلة  $(AB)$

لنحدد المعادلة المختصرة ل  $(AB)$

$$(AB) : y = mx + p \quad \text{لنسع : } m$$

لنحدد  $m$  :

وبما أن :  $A \in (AB)$  و

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad \text{فإن :}$$

$$m = \frac{0-3}{2-0} \quad \text{يعني :}$$

$$m = \frac{-3}{2} \quad \text{ادن :}$$

$$(AB) : y = -\frac{3}{2}x + p \quad \text{ومنه:}$$

لنحدد  $p$

وبما أن :  $A \in (AB)$

$$y_A = \frac{-3}{2}x_A + p \quad \text{فإن :}$$

$$3 = \frac{-3}{2} \times 0 + p \quad \text{يعني :}$$

$$3 = p \quad \text{يعني :}$$

$$(AB) : y = -\frac{3}{2}x + 3 \quad \text{ادن:}$$

3- أ- لدينا  $C$  صورة النقطة  $B$  بالإزاحة  $T$  التي تحول  $A$  إلى  $B$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} \quad \text{يعني :}$$

ادن :  $[AC]$  منتصف  $B$

ب- لدينا :  $B$  منتصف  $[AC]$

$$\begin{cases} \frac{x_C + x_A}{2} = x_B \\ \frac{y_C + y_A}{2} = y_B \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} \frac{x_C + 0}{2} = 2 \\ \frac{y_C + 3}{2} = 0 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} x_C + 0 = 2 \times 2 \\ y_C + 3 = 0 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

و بالتالي :  $\begin{cases} x_C = 4 \\ y_C = -3 \end{cases}$  ادن :

### التمرين الثالث:

أ- لنحسب  $f(2)$  - 1

$$f(2) = \frac{3}{2} \times 2 - 1 \quad \text{يعني :}$$

$$f(2) = 3 - 1 \quad \text{يعني :}$$

$$f(2) = 2 \quad \text{ادن :}$$

ب- ليكن  $x$  هو العدد الذي صورته 1- بالدالة  $f$

$$f(x) = -1 \quad \text{يعني :}$$

$$\frac{3}{2}x - 1 = -1 \quad \text{يعني :}$$

$$\frac{3}{2}x = -1 + 1 \quad \text{يعني :}$$

$$\frac{3}{2}x = 0 \quad \text{يعني :}$$

$$x = 0 \quad \text{يعني :}$$

و بالتالي العدد هو 0

2- أ- لنحسب  $g(3)$

$$g(3) = -\frac{2}{3} \times 3 \quad \text{يعني :}$$


$$g(3) = -2 \quad \text{ادن :}$$

ب- لدينا  $-1$  :  $(D) : y = \frac{3}{2}x$  و  $(\Delta) : y = -\frac{2}{3}x$

$$m_{(D)} \times m_{(\Delta)} = \frac{3}{2} \times -\frac{2}{3} = -1 \quad \text{و بما ان :}$$

$(\Delta)$  عمودي على  $(D)$

ج-



د- العدد الذي صورته 1 هو 1.5

### التمرين الرابع

أ- لنحدد زوج إحداثي المتجهة  $\overrightarrow{AB}$

لدينا :  $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$

يعني :  $\overrightarrow{AB}(2-0; 0-3)$

ادن :  $\overrightarrow{AB}(2; -3)$

ب- لنحسب  $AB$

2- لنحسب  $ID$ 

لدينا  $IDC$  مثلث قائم الزاوية في  $C$   
يعني حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة

$$ID^2 = IC^2 + CD^2$$

$$ID^2 = 1^2 + 2^2$$

$$ID^2 = 5$$

$$ID = \sqrt{5}$$

لنسحب  $IH$

لدينا  $IDH$  مثلث قائم الزاوية في  $D$   
يعني حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة

$$IH^2 = ID^2 + HD^2$$

$$IH^2 = \sqrt{5}^2 + 4^2$$

$$IH^2 = 5 + 16$$

$$IH = \sqrt{21}$$

3- لدينا :  $DBCHFG$  موشور قائم ثلاثي القاعدة  
يعني :

$$V_{DBCHFG} = S_{BCD} \times DH$$

$$V_{DBCHFG} = \frac{BC \times CD}{2} \times DH$$

$$V_{DBCHFG} = \frac{2 \times 2}{2} \times 4$$

$$V_{DBCHFG} = 8 \text{ cm}^3$$

4- لدينا : تكبير المجسم  $DBCHFG$  بنسبة  $k$  أعطى مجسمًا  
حجمه  $27 \text{ cm}^3$


$$k^3 = \frac{27 \text{ cm}^3}{8 \text{ cm}^3}$$

$$k^3 = \frac{27}{8}$$

$$k^3 = \frac{3^3}{2^3}$$

$$k^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3$$

$$k = \frac{3}{2}$$



ج- لنتثبت أن صورة المستقيم  $(AB)$  بالإزاحة  $T$  هو  $(AC)$

نعلم ان الإزاحة  $T$  تحول  $A$  إلى  $B$

يعني ان صورة  $A$  هي  $B$  بالإزاحة  $T$

ولدينا صورة  $B$  هي  $C$  بالإزاحة  $T$

يعني ان : صورة  $(AB)$  هو  $(AC)$  بالإزاحة  $T$

و بما ان  $B$  منتصف  $[AC]$

يعني ان النقط  $A$  و  $C$  مستقيمية

$(AB) = (AC)$

ادن صورة المستقيم  $(AB)$  بالإزاحة  $T$  هو  $(AC)$

د- لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيم  $(T)$  الموازي ل  $(AB)$   
و المار من  $O$  أصل المعلم  $(O, I, J)$

لدينا ،  $(AB) \parallel (T)$

$$(AB) : y = -\frac{3}{2}x + 3 \quad \text{لدينا :}$$

$$(T) : y = m'x + p' \quad \text{لنسع}$$

$$m' = -\frac{3}{2} \quad \text{يعني :}$$

$$(T) : y = -\frac{3}{2}x + p' \quad \text{يعني :}$$

:  $p'$   
لنحدد  $: p'$

و بما أن :  $O \in (T)$

$$y_O = -\frac{3}{2}x_O + p' \quad \text{يعني :}$$

$$0 = -\frac{3}{2} \times 0 + p' \quad \text{يعني :}$$

$$0 = p' \quad \text{يعني :}$$

$$(T) : y = -\frac{3}{2}x \quad \text{و بالتالي :}$$

### التمرين الخامس

1- لنتثبت أن  $IDH$  مثلث قائم الزاوية في  $D$

لدينا :  $ADHE$  مستطيل

$(DH) \perp (DA)$  يعني :

لدينا :  $CDHG$  مستطيل

$(DH) \perp (DC)$  يعني :

و بما ان  $(DH)$  و  $(DA)$  متقاطعان ضمن المستوى

$(ACD)$

$(DH) \perp (ACD)$  يعني :

و بما ان  $(ACD)$  ضمن  $(DI)$  و يمر من  $D$

$(DH) \perp (DI)$  فان :

و بالتالي :  $IDH$  مثلث قائم الزاوية في  $D$

2- أ- لنحدد زوج إحداثي المتجهة :  $\overrightarrow{AB}$

$$\text{لدينا: } \overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$$

$$\text{يعني: } \overrightarrow{AB}(3-1; 0--1)$$

$$\text{ادن: } \overrightarrow{AB}(2;1)$$

ب- لنحسب  $AB$

$$\text{لدينا: } AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$\text{يعني: } AB = \sqrt{(3-1)^2 + (0--1)^2}$$

$$\text{يعني: } AB = \sqrt{4+1}$$

$$\text{ادن: } AB = \sqrt{5}$$

(Δ):  $y = \frac{1}{2}x - 2$  (D):  $y = -2x + 1$  لدينا 1 و

$$\text{و بما ان: } m_{(D)} \times m_{(\Delta)} = -2 \times \frac{1}{2} = -1$$

فإن: (D) عمودي على (Δ)

ب- لندرس الوضع النسبي ل(D) و (AB)

لتحقق من أن (3,0) لا تتنتمي إلى (D)

$$\text{لدينا: } y_B = -2x_B + 1$$

$$\text{يعني: } 0 = -2 \times 3 + 1$$

$$\text{يعني: } 0 = -5$$

ادن (3,0) لا تتنتمي إلى (D)

و بما ان: (1,-1) A تتنتمي إلى (D)

و (-1,1) A تتنتمي إلى (AB)

فإن (D) و (AB) متقطعان في (1,-1)

ملاحظة: المقصود بالوضع النسبي هو هل المستقيمان متوازيان أو متقطعان؟ ويمكن في هذه الحالة إيجاد المعادلة المختصرة ل(AB) ثم مقارنة ميل (AB) و (D)

#### التمرين الرابع

1- لدينا  $f$  دالة خطية

$$\text{يعني: } f(x) = ax$$

$$\text{يعني: } a = \frac{f(x)}{x}$$

$$\text{يعني: } a = \frac{f(2)}{2}$$

$$\text{يعني: } a = \frac{3}{2}$$

$$\text{ادن: } f(x) = \frac{3}{2}x$$

-2- لدينا  $a$  تمثيل  $g$  هو مستقيم لا يمر من أصل

المعلم و بالتالي  $g$  دالة ليست خطية

$$\text{b- مبيانيا نجد: } g(-2) = 0$$

#### تصحيح الامتحان 03

جهة سوس ماسة درعة يونيو 2010

##### التمرين الأول:

1- لنحل المعادلة:  $3(4x + 2) - 3 = 5x$

$$\text{يعني: } 12x + 6 - 3 = 5x$$

$$\text{يعني: } 7x = -3$$

$$\text{يعني: } x = \frac{-3}{7}$$

ادن حل المعادلة الوحيد هو  $\frac{-3}{7}$

2- لنحل المترابحة:  $5x - 2 < 2(x + 5)$

$$\text{يعني: } 5x - 2 < 2x + 10$$

$$\text{يعني: } 3x < 12$$

$$\text{يعني: } x < \frac{12}{3}$$

$$\text{يعني: } x < 4$$

ادن حلول المترابحة هي جميع الأعداد الحقيقة الأصغر قطعا من 4

##### التمرين الثاني

1- لنحسب معدل أطفال هذه الأسر

$$\text{لدينا: } M = \frac{2 \times 1 + 6 \times 2 + 8 \times 3 + 5 \times 4 + 4 \times 5}{25}$$

$$\text{يعني: } M = \frac{2 + 12 + 24 + 20 + 20}{25}$$

$$\text{يعني: } M = \frac{78}{25}$$

$$\text{ادن: } M = 3,12$$

2- عدد الأسر التي يفوق عدد أطفالها المعدل انطلاقا من الجدول الحصصيات التي لها قيمة ميزة أكبر من المعدل هو  $9 = 5 + 4$

##### التمرين الثالث

1- لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيم (D) الذي ميله

2- و يمر من (1,-1)

لدينا بصفة عامة:  $(D): y = mx + p$

و بما ان الميل يساوي 2

$(D): y = -2x + p$

و بما ان  $A(1,-1) \in (D)$

$$\text{يعني: } y_A = -2x_A + p$$

$$\text{يعني: } -1 = -2 \times 1 + p$$

$$\text{يعني: } -1 = -2 + p$$

$$\text{يعني: } -1 + 2 = p$$

$$\text{يعني: } 1 = p$$

ادن:  $(D): y = -2x + 1$

$$IJ = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \quad \text{ادن :}$$

2- لنحسب حجم الهرم

ليكن  $O$  مركز المربع

نلاحظ أن  $(EFGH)$  عمودي  $(SO)$  و أن  $IJKL$  مربع

$$V_{SIJKL} = \frac{1}{3} \times SO \times S_{IJKL} \quad \text{يعني :}$$

$$V_{SIJKL} = \frac{1}{3} \times 8 \times (4\sqrt{2})^2 \quad \text{يعني :}$$

$$V_{SIJKL} = \frac{256}{3} \text{ cm}^3 \quad \text{ادن}$$

إثبات أن  $(SO)$  عمودي

لدينا في المستوى

$DBFH$  منتصف  $[HF]$  و  $O$  منتصف  $[DB]$  و لتكن  $M$  منتصف  $[HB]$

يعني ان في المثلث  $DBH$  لدينا  $DBH$

و ان في المثلث  $EBH$  لدينا  $EBH$

و بما ان  $(BF) \parallel (DH)$

يعني  $(OM) \parallel (SM)$  اي النقط  $O$  و  $S$  و  $M$  مستقيمة

ادن :  $(BF) \parallel (OS)$

و بما ان  $(BF) \perp (EF)$  و  $(BF) \perp (FG)$

يعني  $(BF) \perp (EFGH)$

ادن :  $(OS) \perp (EFGH)$

وبالتالي  $SIJKL$  ارتفاع للهرم

لدينا  $IJ = 4\sqrt{2}$  : و بنفس الطريقة نجد أن :


$LK = 4\sqrt{2}$  ;  $JK = 4\sqrt{2}$  ;  $LJ = 4\sqrt{2}$

يعني  $IJKL$  معين

و بما  $LK = FG$  أن  $LJ = EF$

يعني أن القطران متقاربان

و بالتالي  $IJKL$  مربع




c- لدينا :  $E\left(-1; \frac{3}{2}\right)$  من خلال المعلم

و بما أن :  $E\left(-1; \frac{3}{2}\right) \in (d)$

يعني :  $g(-1) = \frac{3}{2}$

ادن العدد الذي صورته  $g$  بالدالة  $\frac{3}{2}$  هو -1

-3



لدينا صورة  $E$  هي

و لدينا صورة  $F'$  هي

يعني صورة  $(EF)$  هو  $(OF')$

لتحقق من ان تمثيل  $f$  يمر من النقطتين  $O$  و  $F'$

لدينا مبيانيا :  $F'\left(1; \frac{3}{2}\right)$

بما أن :  $f(x) = \frac{3}{2}x$

يعني :  $f(1) = \frac{3}{2} \times 1$

يعني :  $f(1) = \frac{3}{2}$

ادن :  $F'$  تنتهي إلى تمثيل  $f$

و لدينا :  $f$  دالة خطية

يعني :  $f$  تنتهي إلى تمثيل  $f$

ومنه تمثيل  $f$  هو المستقيم  $(OF')$

ادن صورة  $(d)$  بهذه الإزاحة هي التمثيل المبيانى للدالة  $f$

### التمرين الخامس

1- لنحسب  $IJ$

لدينا  $EIJ$  مثلث قائم الزاوية في  $E$

يعني حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة

$$IJ^2 = EI^2 + EJ^2 \quad \text{يعني :}$$

$$IJ^2 = 4^2 + 4^2 \quad \text{يعني :}$$

$$ID^2 = 32 \quad \text{يعني :}$$

لدينا نصف الحصيص الاجمالي هو :  $\frac{50}{2} = 25$

و انطلاقا من جدول الحصصيات المترادفة للحصص المتراكمة الأكبر مباشرة من 25 هو 35 الموافق لقيمة الميزة 20

ادن القيمة الوسطية هي 20

$$M = \frac{10 \times 5 + 13 \times 10 + 12 \times 20 + 9 \times 50 + 6 \times 100}{50}$$

3- لدينا :

$$M = \frac{50 + 130 + 240 + 450 + 600}{50}$$

يعني :

$$M = \frac{1470}{50}$$

يعني :

$$M = 29,4$$

ادن :

### التمرين الثاني

1- لنحل المعادلة  $x - \sqrt{3} = 0$

$$x = \sqrt{3}$$

يعني:

ادن حل المعادلة الوحيد هو :  $\sqrt{3}$

- لنحل المعادلة  $\sqrt{3}x - 1 = 0$

$$\sqrt{3}x = 1$$

يعني:

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

يعني:

ادن حل المعادلة الوحيد هو :  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

ب تحقق ان :  $(x - \sqrt{3})(\sqrt{3}x - 1) = \sqrt{3}x^2 - 4x + \sqrt{3}$

لدينا:  $(x - \sqrt{3})(\sqrt{3}x - 1) = x \times \sqrt{3}x - x \times 1 - \sqrt{3} \times \sqrt{3}x + \sqrt{3} \times 1$

$(x - \sqrt{3})(\sqrt{3}x - 1) = \sqrt{3}x^2 - x - 3x + \sqrt{3}$

يعني:

$(x - \sqrt{3})(\sqrt{3}x - 1) = \sqrt{3}x^2 - 4x + \sqrt{3}$

ادن:

ج- لدينا:  $\sqrt{3}x^2 - 4x + \sqrt{3} = 0$

$$(x - \sqrt{3})(\sqrt{3}x - 1) = 0$$

يعني:

يعني:  $x - \sqrt{3} = 0$  أو  $\sqrt{3}x - 1 = 0$

$$x = \sqrt{3} \quad \text{أو} \quad x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

يعني:

ادن للمعادلة حلان هما :  $\sqrt{3}$  و  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

2- لنحل المترادفة :  $\frac{x-1}{2} - \frac{2x+3}{2} \leq \frac{x}{6}$

$$\frac{(x-1)-(2x+3)}{2} \leq \frac{x}{6}$$

يعني:

$$\frac{x-1-2x-3}{2} \leq \frac{x}{6}$$

يعني:

$$\frac{-x-4}{2} \leq \frac{x}{6}$$

يعني:

$$6 \times (-x-4) \leq 2 \times x$$

يعني:

### التمرين السادس

ليكن  $x$  ثمن المصباح العادي و  $y$  ثمن المصباح الاقتصادي

$$\begin{cases} 3x + y = 31 \\ 5x + 2y = 57 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} y = 31 - 3x \\ 5x + 2y = 57 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} y = 31 - 3x \\ 5x + 2(31 - 3x) = 57 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} y = 31 - 3x \\ 5x + 62 - 6x = 57 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} y = 31 - 3x \\ -x = 57 - 62 = -5 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} y = 31 - 3x \\ x = 5 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} y = 31 - 15 = 16 \\ x = 5 \end{cases}$$

يعني :

ادن ثمن المصباح العادي هو 5 دراهم و ثمن المصباح الاقتصادي هو 16 درهما .

ليكن  $a$  عدد المصابيح الاقتصادية

يعني:  $2a$  هو عدد المصابيح العادية

$$16 \times a + 5 \times 2a \leq 100$$

يعني:

$$16a + 10a \leq 100$$

يعني:

$$26a \leq 100$$

يعني:

$$a \leq \frac{100}{26}$$

يعني:

$$a \leq 3,85$$

يعني:

وبالتالي عدد المصابيح الاقتصادية لا يتجاوز 3 و العادية لا يتجاوز 6

ادن مجموع المصابيح القصوى هو 9

### تصحيح الامتحان 04

**جهة الغرب الشراردة يونيو 2010**

### التمرين الأول

1- لدينا اكبر حصص هو 13 موافق لقيمة الميزة 10

ادن منوال المتسلسلة هو 10

2- القيمة الوسطية

الميزة	الحصص	ح.المترادف
100	50	20
06	09	12
50	44	35
		23
		10

$$x = \frac{2}{2} = 1 \quad \text{يعني:}$$

و بالتالي حل النظمة هو الزوج : (1;-1)

التمرين الثالث  
الطريقة الأولى:

1- لنبيّن أن  $D$  هي صورة  $C$  بالإزاحة ذات المتجهة  $\overrightarrow{BA}$

لنحدد زوج إحداثي المتجهة :  $\overrightarrow{BA}$

$$\overrightarrow{BA}(x_A - x_B; y_A - y_B)$$

$$\text{لدينا: } \overrightarrow{BA}\left(\frac{-1}{2} - 2; 0 - 0\right) \quad \text{يعني:}$$

$$\overrightarrow{BA}\left(\frac{-5}{2}; 0\right) \quad \text{ادن:}$$

لنحدد زوج إحداثي المتجهة :  $\overrightarrow{CD}$

$$\overrightarrow{CD}(x_D - x_C; y_D - y_C)$$

$$\text{لدينا: } \overrightarrow{CD}\left(-2 - \frac{1}{2}; 2 - 2\right) \quad \text{يعني:}$$

$$\overrightarrow{CD}\left(\frac{-5}{2}; 0\right) \quad \text{ادن:}$$

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$$

و بالتالي :  $D$  هي صورة  $C$  بالإزاحة ذات المتجهة  $\overrightarrow{BA}$

$$\text{لدينا: } 2- \text{ لـ } \overrightarrow{BA}\left(\frac{-5}{2}; 0\right)$$

$$\text{يعني: } AB = \sqrt{\left(\frac{-5}{2}\right)^2 + 0^2}$$

$$\text{يعني: } AB = \sqrt{\frac{25}{4}}$$

$$\text{ادن: } AB = \frac{5}{2}$$

$$\text{و لدينا: } BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$$

$$\text{يعني: } BC = \sqrt{\left(\frac{1}{2} - 2\right)^2 + (2 - 0)^2}$$

$$\text{يعني: } BC = \sqrt{\left(\frac{-3}{2}\right)^2 + (2)^2}$$

$$\text{يعني: } BC = \sqrt{\frac{9}{4} + 4}$$

$$\text{يعني: } BC = \sqrt{\frac{25}{4}}$$

$$\text{ادن: } BC = \frac{5}{2}$$

$$-6x - 24 \leq 2x \quad \text{يعني:}$$

$$-6x - 2x \leq 24 \quad \text{يعني:}$$

$$-8x \leq 24 \quad \text{يعني:}$$

$$x \geq \frac{24}{-8} \quad \text{يعني:}$$

$$x \geq -3 \quad \text{يعني:}$$

و بالتالي حلول المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقة الأكبر من أو تساوي -3

$$-3- \text{ أ- } \text{لـ } \text{لدينا: } (S_1): \begin{cases} x - 2y = -1 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$$

$$(S_1): \begin{cases} x = -1 + 2y \\ 2x + 3y = 12 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$(S_1): \begin{cases} x = -1 + 2y \\ 2(-1 + 2y) + 3y = 12 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$(S_1): \begin{cases} x = -1 + 2y \\ -2 + 4y + 3y = 12 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$(S_1): \begin{cases} x = -1 + 2y \\ 7y = 12 + 2 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$(S_1): \begin{cases} x = -1 + 2y \\ 7y = 14 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$(S_1): \begin{cases} x = -1 + 2y \\ y = \frac{14}{7} = 2 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$(S_1): \begin{cases} x = -1 + 2 \times 2 = 3 \\ y = 2 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

و بالتالي حل النظمة هو الزوج : (3;2)

$$\text{ب- } \text{لـ } \text{لدينا: } (S_2): \begin{cases} 2x + y = 1 \\ 3x - 4y = 7 \end{cases}$$

$$(S_2): \begin{cases} 2x + y = 1 \\ 3x - 4y = 7 \end{cases} \quad \text{يعني: } \times -3 \quad \times 2$$

$$(S_2): \begin{cases} -6x - 3y = -3 \\ 6x - 8y = 14 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

نجم المعادلتين طرفا بطرف

$$-6x - 3y + 6x - 8y = -3 + 14 \quad \text{فـجد: } -11y = 11$$

$$\text{ادن: } y = \frac{11}{-11} = -1 \quad \text{يعني: } y = -1$$

نختار إحدى المعادلتين الأصليتين من النظمة و نعرض

$$\text{لـ } \text{لدينا: } 2x + y = 1$$

$$2x + -1 = 1 \quad \text{يعني: } 2x = 2$$

$$\text{يعني: } x = 1$$

و بما أن  $B \in (BD)$  :

$$y_B = \frac{-1}{2}x_B + p'$$

$$0 = \frac{-1}{2} \times 2 + p'$$

$$0 = -1 + p'$$

$$1 = p'$$

$$\text{اذن: } (DB) : y = \frac{-1}{2}x + 1$$

$$(DB) : y = \frac{-1}{2}x + 1 \text{ لدينا: } (AC) : y = 2x + 1$$

$$\text{و بما ان: } m_{(DB)} \times m_{(AC)} = -\frac{1}{2} \times 2 = -1$$

فإن:  $(AC)$  عمودي على  $(DB)$

4- لتحقق من أن  $J(0,1)$  تتنمي لل المستقيمين  $(AC)$  و  $(BD)$

$$\text{لدينا: } (AC) : y = 2x + 1$$

$$y_J = 2x_J + 1$$

$$1 = 2 \times 0 + 1$$

$$1 = 1$$

اذن:  $J(0,1)$  تتنمي لل المستقيم  $(AC)$

$$\text{لدينا: } (DB) : y = \frac{-1}{2}x + 1$$

$$y_J = \frac{-1}{2}x_J + 1$$

$$1 = \frac{-1}{2} \times 0 + 1$$

$$1 = 1$$

اذن:  $J(0,1)$  تتنمي لل المستقيم  $(BD)$

5- لنبين أن القطعتين  $[AC]$  و  $[BD]$  لهما نفس المنتصف

لتكن  $M$  منتصف  $[AC]$

$$M \left( \frac{x_A + x_C}{2}; \frac{y_A + y_C}{2} \right)$$

$$M \left( \frac{\frac{-1}{2} + \frac{1}{2}}{2}; \frac{0 + 2}{2} \right)$$

$$M(0;1)$$

لتكن  $N$  منتصف  $[BD]$

$$N \left( \frac{x_B + x_D}{2}; \frac{y_B + y_D}{2} \right)$$

3- طبيعة الرباعي  $ABCD$

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$$

يعني:  $ABCD$  متوازي الأضلاع

$$AB = BC = \frac{5}{2}$$

فإن  $ABCD$  معين  
الطريقة الثانية:

1- لنبين أن المعادلة المختصرة لل المستقيم  $(AC)$  هي:

$$y = 2x + 1$$

لنحدد المعادلة المختصرة ل  $(AC)$

$$(AC) : y = mx + p$$

:  $m$  لنحدد

$$B \in (AC) \text{ و } A \in (AC) \text{ : بما ان:}$$

$$m = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} \text{ فإن:}$$

$$m = \frac{2 - 0}{\frac{1}{2} - \frac{-1}{2}} \text{ يعني:}$$

$$m = \frac{2}{1} \text{ اذن:}$$

$$(AC) : y = 2x + p \text{ لنحدد:}$$

$$A \in (AC) : \text{ وبما ان:}$$

$$y_A = 2x_A + p \text{ فإن:}$$

$$0 = 2 \times \frac{-1}{2} + p \text{ يعني:}$$

$$0 = -1 + p \text{ يعني:}$$

$$1 = p \text{ يعني: اذن:}$$

$$(AC) : y = 2x + 1$$

2- بين أن المعادلة المختصرة لل المستقيم  $(BD)$  هي:

$$y = -\frac{1}{2}x + 1$$

لنحدد المعادلة المختصرة ل  $(BD)$

$$(BD) : y = m'x + p' \text{ لنحدد:}$$

$$B \in (BD) \text{ و } D \in (BD) \text{ : بما ان:}$$

$$m' = \frac{y_B - y_D}{x_B - x_D} \text{ فإن:}$$

$$m' = \frac{0 - 2}{\frac{1}{2} - \frac{-1}{2}} \text{ يعني:}$$

$$m' = \frac{-2}{2} = \frac{-1}{2} \text{ اذن:}$$

$$(BD) : y = \frac{-1}{2}x + p' \text{ ومنه: لنحدد:}$$

يعني ان تمثل  $h$  يمر النقطة ذات الاحداثيات  $(3;3)$   
و بما ان المستقيم المار من النقطة ذات الاحداثيات  $(3;3)$  هو  
 $(d_2)$

ادن تمثل  $h$  هو  $(d_2)$  هو  
لدينا  $g$  الدالة التالية

يعني تمثيلها هو مستقيم لا يمر من اصل المعلم  
و بما ان  $2 = 0 + 2 = 0(0)$

يعني ان تمثل  $g$  يمر النقطة ذات الاحداثيات  $(0;2)$   
و بما ان المستقيم المار من النقطة ذات الاحداثيات  $(0;2)$  هو  
 $(d_3)$

ادن تمثل  $g$  هو  $(d_3)$

3- لدينا الافصول  $a$  الذي يحقق :  $f(a) = g(a) = h(a)$   
هو أقصول نقطة تقاطع المستقيمات الثلاثة  
مبيانيا المستقيمات تقاطع في النقطة ذات الافصل 2  
و بالتالي قيمة العدد  $a$  هي 2

#### التمرين الخامس

1- لدينا  $(AS) \perp (SB)$  و  $(AS) \perp (SC)$

و بما ان  $(SC)$  و  $(SB)$  يتقاطع في  $S$

يعني :  $(AS) \perp (SBC)$

ادن:  $(AS)$  ارتفاع للهرم  $SABC$

$$\text{يعني : } V_{SABC} = \frac{1}{3} \times SA \times S_{SBC}$$

$$\text{يعني : } V_{SABC} = \frac{1}{3} \times 6 \times \frac{6 \times 6}{2}$$

$$\text{ادن : } V_{SABC} = 36 \text{ cm}^3$$

2- لنحسب  $AB$

لدينا  $SAB$  مثلث قائم الزاوية في  $S$   
يعني حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة

$$\text{يعني : } AB^2 = SA^2 + SB^2$$

$$\text{يعني : } AB^2 = 6^2 + 6^2$$

$$\text{يعني : } AB^2 = 72$$

$$\text{ادن : } AB = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

و بنفس الطريقة نجد :  $BC = 6\sqrt{2}$  و  $AC = 6\sqrt{2}$   
و بالتالي المثلث  $ABC$  متساوي الأضلاع طول ضلعه  $6\sqrt{2}$

3-أ- لدينا  $AB = AC$

يعني  $A$  تنتهي إلى واسط  $[BC]$

و بما أن  $H$  منتصف  $[BC]$

يعني :  $(AH)$  واسط  $[BC]$

يعني:  $N\left(\frac{2+2}{2}; \frac{0+2}{2}\right)$

ادن :  $N(0;1)$

و بالتالي القطعتين  $[AC]$  و  $[BD]$  لهما نفس المنتصف

$M = N = J$

-6

لدينا القطعتين  $[AC]$  و  $[BD]$  لهما نفس المنتصف  $J$

يعني:  $ABCD$  متوازي الأضلاع

و بما ان :  $(DB)$  عمودي على  $(AC)$

و  $J$  تنتهي للمستقيمين  $(AC)$  و  $(BD)$

يعني أن قطرى المتوازي الأضلاع  $ABCD$  متعمدان في

منتصفهما

ادن  $ABCD$  معين

#### التمرين الرابع

1- أ- لدينا  $f$  دالة خطية

يعني :  $f(x) = ax$

$$\text{يعني : } a = \frac{f(x)}{x}$$

$$\text{يعني : } a = \frac{f(2)}{2}$$

$$\text{يعني : } a = \frac{4}{2} = 2$$

ادن :  $f(x) = 2x$

ب- لدينا  $h$  دالة تألفية

يعني :  $h(x) = mx + b$

لنحدد :  $m$

$$\text{بما ان : } m = \frac{h(4) - h(2)}{4 - 2}$$

$$\text{يعني : } m = \frac{-2}{2} = -1$$

ادن :  $h(x) = -1x + b$

لنحدد:  $b$

لدينا :  $h(3) = 3$

$$\text{يعني: } -1 \times 3 + b = 3$$

$$\text{يعني: } -3 + b = 3$$

$$\text{يعني: } b = 3 + 3 = 6$$

ادن :  $h(x) = -x + 6$

2- لدينا  $f$  دالة خطية

يعني ان تمثيلها يمر من اصل المعلم

ادن  $(d_1)$  هو تمثيل  $f$

لدينا  $h$  الدالة التألفية

يعني تمثيلها هو مستقيم لا يمر من اصل المعلم

و بما ان  $h(3) = 3$

## تصحيح الامتحان 05

جهة دكالة عبدة يونيو 2009

## التمرين الأول

$$\begin{cases} 2x + 5y = 130 \\ x + y = 35 \end{cases} \quad \text{أ- لدينا : } -1$$

$$\begin{cases} 2x + 5y = 130 \\ x = 35 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 2(35 - y) + 5y = 130 \\ x = 35 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 70 - 2y + 5y = 130 \\ x = 35 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 70 + 3y = 130 \\ x = 35 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 3y = 130 - 70 \\ x = 35 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} 3y = 60 \\ x = 35 - y \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} y = \frac{60}{3} = 20 \\ x = 35 - y = 35 - 20 = 15 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

ادن حل النظمة هو الزوج : (15; 20)

بـ ليكن  $x$  هو عدد القطع من فئة درهمين و  $y$  عدد القطع من فئة 5 دراهم

$$\begin{cases} 2x + 5y = 130 \\ x + y = 35 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

وبما ان حل هذه النظمة حسب السؤال السابق هو

$$\begin{cases} y = 20 \\ x = 15 \end{cases}$$

و بالتالي عدد القطع من فئة درهمين هو 15 قطعة و عدد القطع من فئة 5 دراهم هو 20 قطعة

$$2 - \text{لحل المترابطة } \frac{2}{3}x + 4 \leq 2x$$

$$\frac{2}{3}x - 2x \leq -4 \quad \text{يعني :}$$

$$\frac{2}{3}x - \frac{6}{3}x \leq -4 \quad \text{يعني :}$$

$$\frac{-4}{3}x \leq -4 \quad \text{يعني :}$$

$$x \geq \frac{-4}{\frac{-4}{3}} \quad \text{يعني :}$$

$$x \geq -4 \times \frac{3}{-4} \quad \text{يعني :}$$

يعني :  $AHB$  مثلث قائم الزاوية في  $H$   
يعني حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة

$$AH^2 + BH^2 = AB^2 \quad \text{يعني :}$$

$$AH^2 = AB^2 - BH^2 \quad \text{يعني :}$$

$$AH^2 = (6\sqrt{2})^2 - (3\sqrt{2})^2 \quad \text{يعني :}$$

$$AH^2 = 72 - 18 \quad \text{يعني :}$$

$$AH^2 = 54 \quad \text{يعني :}$$

$$AH = \sqrt{54} = \sqrt{27 \times 2} = \sqrt{3^2 \times 3 \times 2} \quad \text{يعني :}$$

$$AH = 3\sqrt{6} \quad \text{ادن :}$$

بـ مساحة المثلث :  $ABC$ 

$$S_{ABC} = \frac{AH \times BC}{2} \quad \text{لدينا :}$$

$$S_{ABC} = \frac{3\sqrt{6} \times 6\sqrt{2}}{2} \quad \text{يعني :}$$

$$S_{ABC} = \frac{18\sqrt{12}}{2} \quad \text{يعني :}$$

$$S_{ABC} = 9\sqrt{12} \quad \text{يعني :}$$

$$S_{ABC} = 9\sqrt{4 \times 3} = 18\sqrt{3} \quad \text{ادن :}$$

ـ4 - لدينا  $SK$  ارتفاع للهرم

$$V_{SABC} = \frac{1}{3} \times SK \times S_{ABC} \quad \text{يعني :}$$

$$V_{SABC} = 36cm^3 \quad \text{وبما ان :}$$

$$\frac{1}{3} \times SK \times S_{ABC} = 36 \quad \text{يعني :}$$

$$SK \times S_{ABC} = 36 \times 3 \quad \text{يعني :}$$

$$SK = \frac{36 \times 3}{S_{ABC}} \quad \text{يعني :}$$

$$SK = \frac{36 \times 3}{18\sqrt{3}} \quad \text{يعني :}$$

$$SK = \frac{2 \times 3}{\sqrt{3}} \quad \text{يعني :}$$

$$SK = \frac{6}{\sqrt{3}} \quad \text{يعني :}$$

$$SK = \frac{6 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} \quad \text{يعني :}$$

$$SK = \frac{6 \times \sqrt{3}}{3} \quad \text{يعني :}$$

$$SK = 2\sqrt{3} \quad \text{ادن :}$$

بـ- لحل المعادلة  $\frac{2}{3}x + 4 = 5$

$$\frac{2x}{3} + \frac{12}{3} = \frac{15}{3}$$

يعني:

$$\frac{2x + 12}{3} = \frac{15}{3}$$

يعني:

$$2x + 12 = 15$$

يعني:

$$2x = 15 - 12$$

يعني:

$$2x = 3$$

يعني:

$$x = \frac{3}{2}$$

يعني:

ادن حل المعادلة الوحيد هو  $\frac{3}{2}$

ليكن  $x$  هو العدد الذي صورته 5 بالدالة  $g$

$$g(x) = 5$$

يعني:

$$\frac{2}{3}x + 4 = 5$$


يعني:

$$x = \frac{3}{2}$$

يعني:

و بالتالي العدد هو  $\frac{3}{2}$

### 3- التمثيل



بـ- أقصول نقطة تقاطع التمثيل المباني للدالة  $g$  مع محور الأفاصيل هو -6

4- أـ- لحل المعادلة  $\frac{2}{3}x + 4 = 2x$

$$\frac{2x}{3} + \frac{12}{3} = \frac{6x}{3}$$

يعني:

$$2x + 12 = 6x$$

يعني:

$$4x = 12$$


يعني:

$$x = 3$$

يعني:

ادن حل المعادلة هو 3

يعني:  $x \geq 3$   
و بالتالي حلول المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقة الأكبر  
من أو تساوي 3



### التمرين الثاني

1- لدينا  $f$  دالة خطية

$$f(x) = ax$$

يعني:

$$a = \frac{f(x)}{x}$$

يعني:

بما ان: التمثيل المباني ل  $f$  يمر من النقطة  $I(1; 2)$

$$f(1) = 2$$

يعني:

$$a = \frac{f(1)}{1}$$

يعني:

$$a = \frac{2}{1} = 2$$

يعني:

$$f(x) = 2x$$

ادن:

بـ- لدينا  $g$  دالة تألفية

$$g(x) = mx + b$$

لنحدد:

$$m = \frac{g(0) - g(-6)}{0 - (-6)}$$

بما ان:

$$m = \frac{4 - 0}{6} = \frac{2}{3}$$

يعني:

$$g(x) = \frac{2}{3}x + b$$

ادن:

لنحدد:

$$g(-6) = 0$$

لدينا:

$$\frac{2}{3} \times -6 + b = 0$$

يعني:

$$-4 + b = 0$$

يعني:

$$b = 4$$

يعني:

$$g(x) = \frac{2}{3}x + 4$$

ادن:

2- لدينا:  $f(x) = 2x$

$$f(2) = 2 \times 2$$

يعني:

$$f(2) = 4$$

ادن:

$$g(x) = \frac{2}{3}x + 4$$

لدينا:

$$g(3) = \frac{2}{3} \times 3 + 4$$

يعني:


$$g(3) = 2 + 4 = 6$$

ادن:

- 2- لدينا صورة  $A$  بالإزاحة  $T$  هي  $B$   
 ولدينا صورة  $B$  بالإزاحة  $T'$  هي  $C$   
 ولدينا صورة  $C$  بالإزاحة  $T$  هي  $A$   
 ادن صورة المثلث  $ABC$  بالإزاحة  $T$  هو المثلث  $IB'C'$   
 بـ لدينا صورة الزاوية  $BAC$  هي  $B'IC'$   
 و نعلم أن صورة زاوية بإزاحة هي زاوية تقييسها  
 وبما أن:  $BAC = 90^\circ$   
 فان:  $B'IC' = 90^\circ$

التمرين الخامس

-1-



بـ لتكن  $N$  منتصف  $[AB]$

$$N\left(\frac{x_B + x_A}{2}; \frac{y_B + y_A}{2}\right)$$

يعني:

$$N\left(\frac{1+3}{2}; \frac{7+1}{2}\right)$$

يعني:

$$N(2;4)$$

يعني:

يعني:  $N = M$  وبالتالي:  $M$  منتصف  $[AB]$

أـ احسب:  $AM$  و  $OA$

$$OA = \sqrt{(x_A - x_O)^2 + (y_A - y_O)^2}$$

لدينا:

$$OA = \sqrt{(3-0)^2 + (1-0)^2}$$

يعني:

$$OA = \sqrt{9+1}$$

يعني:

$$OA = \sqrt{10}$$

ادن:

$$AM = \sqrt{(x_M - x_A)^2 + (y_M - y_A)^2}$$

لدينا:

$$AM = \sqrt{(2-3)^2 + (4-1)^2}$$

يعني:

$$AM = \sqrt{1+9}$$

يعني:

$$AM = \sqrt{10}$$

ادن:

$$\frac{2}{3}x + 4 = 2x$$

يعني:  $g(x) = f(x)$

يعني: قيمة  $x = 3$  هي أصول نقطة التقاطع

و لدينا:  $g(3) = 6$

ادن إحداثي نقطة التقاطع هما: (3;6)

التمرين الثالث

a -1

الصنف	[80;100[	[60;80[	40;60[	20;40[	[0;20[
الحصيص	2	8	16	10	4
ح متراكم	40	38	30	14	4
مركز الصنف	90	70	50	30	10

b - لدينا اكبر حصيص هو 16 موافق للصنف [40;60]

ادن منوال المتسلسلة هو [40;60]

$$\text{لدينا نصف الحصيص الاجمالي هو: } \frac{50}{2} = 25$$

و انطلاقا من جدول الحصيصات المتراكمة الحصيص المتراكم الأكبر مباشرة من 25 هو 35 الموافق لقيمة الميزة

20

ادن القيمة الوسطية هي 20

$$M = \frac{10 \times 4 + 30 \times 10 + 50 \times 16 + 70 \times 8 + 90 \times 2}{40}$$

$$M = \frac{40 + 300 + 800 + 560 + 180}{40}$$

يعني:

$$M = \frac{1880}{40}$$

يعني:

$$M = 47$$

ادن:


$$\frac{40}{2} = 20$$

لدينا نصف الحصيص الاجمالي هو 20

و انطلاقا من جدول الحصيصات المتراكمة الحصيص المتراكم الأكبر مباشرة من 20 هو 30 الموافق للصنف

[40;60]

و وبالتالي القيمة الوسطية توجد ضمن الصنف [40;60]

التمرين الرابع

$$\begin{aligned} & \text{ويمـا أـن : } B \in (AB) \\ & y_B = -3x_B + p' \quad \text{فـإنـ :} \\ & 7 = -3 \times 1 + p' \quad \text{يـعـنـيـ :} \\ & 7 = -3 + p' \quad \text{يـعـنـيـ :} \\ & 10 = p' \quad \text{يـعـنـيـ :} \\ & \text{اذـنـ : } (AB) : y = -3x + 10 \end{aligned}$$

$$\text{جـ لـديـنـا : } (AB) : y = -3x + 10 \quad \text{وـ } (OA) : y = \frac{1}{3}x$$

$$\text{وـ بـمـاـ انـ : } m_{(AB)} \times m_{(OA)} = -3 \times \frac{1}{3} = -1$$

فـانـ : (AB) عمـودـيـ عـلـىـ (OA)  
التمرين السادس

1- لـديـنـا Sـ هيـ مـمـاثـلـةـ النـقـطـةـ Bـ بـالـنـسـبـةـ لـنـقـطـةـ Bـ  
SB' = 2 \times BB'

$$\text{ادـنـ : } SB' = 2 \times BB' = 2 \times 6 = 12 \text{cm}$$

بـ لـديـنـا SA'B'ـ مـثـلـثـ قـائـمـ الزـاوـيـةـ فـيـ B'ـ  
يـعـنـيـ حـسـبـ مـبـرـهـةـ فـيـتـاغـورـسـ المـبـاشـرـةـ

$$SA'^2 = A'B'^2 + SB'^2 \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$SA'^2 = 6^2 + 12^2 \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$SA'^2 = 36 + 144 \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$SA' = \sqrt{36+144} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5} \quad \text{ادـنـ :}$$

جـ لـديـنـاـ فـيـ المـثـلـثـ SA'B'ـ

(IB) // (A'B')ـ [SB']ـ وـ Bـ منـتـصـفـ

ونـعـلـمـ انـ الـمـسـتـقـيمـ الـمـارـ مـنـ مـنـتـصـفـ ضـلـعـ مـثـلـثـ وـ الـمـواـزـيـ  
لـحـاـلـ الـضـلـعـ الـثـالـثـ يـقطـعـ الـضـلـعـ الـمـقـابـلـ فـيـ مـنـتـصـفـهـ

ادـنـ : Iـ منـتـصـفـ [SA']ـ

$$V_{ABCD'A'B'C'D'} = AB^3 \quad \text{أـ لـديـنـاـ :}$$

$$V_{ABCD'A'B'C'D'} = 6^3 \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$V_{ABCD'A'B'C'D'} = 216 \text{cm}^3 \quad \text{ادـنـ :}$$

$$V_{SA'B'C'} = \frac{1}{3} \times SB' \times S_{A'B'C'} \quad \text{بـ لـديـنـاـ :}$$

$$V_{SA'B'C'} = \frac{1}{3} \times 12 \times \frac{6 \times 6}{2} \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$V_{SA'B'C'} = 72 \text{cm}^3 \quad \text{ادـنـ :}$$

$$k = \frac{SB}{SB'} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \quad \text{أـ لـديـنـاـ :}$$

وـ بـالـتـالـيـ نـسـبـةـ التـصـغـيرـ هـيـ  $\frac{1}{2}$

بـ لـديـنـاـ :  $V_{SIBJ} = k^3 \times V_{SA'B'C'}$

$$V_{SIBJ} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times 72 = 9 \text{cm}^3 \quad \text{ادـنـ :}$$

بـ لـنـحـدـ زـوـجـ إـحـادـيـتـيـ المـتـجـهـةـ :  $\overrightarrow{OA}$

$$\overrightarrow{OA}(x_A - x_O; y_A - y_O) \quad \text{لـديـنـاـ :}$$

$$\overrightarrow{OA}(3 - 0; 1 - 0) \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$\overrightarrow{OA}(3; 1) \quad \text{ادـنـ :}$$

لـنـحـدـ زـوـجـ إـحـادـيـتـيـ المـتـجـهـةـ :  $\overrightarrow{CM}$

$$\overrightarrow{CM}(x_M - x_C; y_M - y_C) \quad \text{لـديـنـاـ :}$$

$$\overrightarrow{CM}(2 - -1; 4 - 3) \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$\overrightarrow{CM}(3; 1) \quad \text{ادـنـ :}$$

6- أـ لـنـحـدـ المـعـاـدـلـةـ المـخـتـصـرـةـ لـ (OA)

$$(OA) : y = mx + p \quad \text{لـنـصـعـ :}$$

لـنـحـدـ mـ :

$$O \in (OA) \quad \text{وـ } A \in (OA) \quad \text{وـ بـمـاـ انـ :}$$

$$m = \frac{y_O - y_A}{x_O - x_A} \quad \text{فـإنـ :}$$

$$m = \frac{0 - 1}{0 - 3} \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$m = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3} \quad \text{ادـنـ :}$$

$$(OA) : y = \frac{1}{3}x + p \quad \text{وـمـنـهـ :}$$

لـنـحـدـ pـ :

$$O \in (OA) \quad \text{وـ بـمـاـ انـ :}$$

$$y_O = \frac{1}{3}x_O + p \quad \text{فـإنـ :}$$

$$0 = \frac{1}{3} \times 0 + p \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$0 = 0 + p \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$0 = p \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$(OA) : y = \frac{1}{3}x \quad \text{ادـنـ :}$$

لـنـحـدـ المـعـاـدـلـةـ المـخـتـصـرـةـ لـ (AB)

$$(AB) : y = m'x + p' \quad \text{لـنـصـعـ :}$$

لـنـحـدـ m'ـ :

$$B \in (AB) \quad \text{وـ } A \in (AB) \quad \text{وـ بـمـاـ انـ :}$$

$$m' = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad \text{فـإنـ :}$$

$$m' = \frac{7 - 1}{1 - 3} \quad \text{يـعـنـيـ :}$$

$$m' = \frac{6}{-2} = -3 \quad \text{ادـنـ :}$$

$$(AB) : y = -3x + p' \quad \text{وـمـنـهـ :}$$

لـنـحـدـ p'ـ :

نختار إحدى المعادلتين الأصليتين من النظمة و نعرض

$$y = 2$$

$$\text{لدينا : } 3x + 2y = 1$$

$$\text{يعني: } 3x + 2 \times 2 = 1$$

$$\text{يعني: } 3x + 4 = 1$$

$$\text{يعني: } 3x = -3$$


$$\text{يعني: } x = \frac{-3}{3} = -1$$

ادن حل النظمة هو الزوج : (-1; 2)

### التمرين الثاني

1-الشكل

2-الشكل



3- أ- لنبين أن المستقيم (BC) يوازي المستقيم (AE)

لدينا : النقطة E صورة النقطة C بالإزاحة التي تحول B إلى A

$$\text{يعني: } \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CE}$$

يعني: ABCE متوازي الأضلاع  
ادن : (BC) يوازي المستقيم (AE)

$$\text{ب- لدينا : } \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$$

يعني: ABDC متوازي الأضلاع

$$\text{ادن : } \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DC}$$

و نعلم حسب السؤال السابق :  $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CE}$

$$\text{اي : } \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CE}$$

يعني: C منتصف [DE]

$$\text{يعني: } DE = 2DC$$

$$\text{ادن : } DE = 2AB$$

### التمرين الثالث

1- لنحدد زوج احداثي النقطة E منتصف القطعة

[JB]

$$\text{يعني: } E\left(\frac{x_B + x_J}{2}; \frac{y_B + y_J}{2}\right)$$

$$\text{يعني: } E\left(\frac{-4+0}{2}; \frac{3+1}{2}\right)$$

### تصحيح الامتحان 06

الجهة الشرقية يونيو 2009

#### التمرين الأول

1- لحل المعادلة :  $7x + 5 = 3x + 2$

$$\text{يعني : } 7x - 3x = 2 - 5$$

$$\text{يعني: } 4x = -3$$

$$\text{يعني: } x = \frac{-3}{4}$$

ادن حل المعادلة الوحيد هو  $\frac{-3}{4}$

1- لنعمل التعبير التالي  $A = (3x + 8)^2 - 16$

$$\text{يعني: } A = (3x + 8)^2 - 4^2$$

$$\text{يعني: } A = ((3x + 8) - 4)((3x + 8) + 4)$$

$$\text{ادن: } A = (3x + 4)(3x + 12)$$

ب- لنسننتج حل المعادلة :  $(3x + 8)^2 = 16$

$$\text{يعني : } (3x + 8)^2 - 16 = 0$$

و انطلاق من السؤال السابق

$$\text{يعني: } (3x + 4)(3x + 12) = 0$$

$$\text{يعني : } 3x + 4 = 0 \quad \text{أو } 3x + 12 = 0$$

$$\text{يعني : } 3x = -4 \quad \text{أو } 3x = -12$$

$$\text{يعني : } x = \frac{-4}{3} \quad \text{أو } x = \frac{-12}{3} = -4$$

وبالتالي للمعادلة حلان هما: -4 و  $\frac{-4}{3}$

2- لحل المترابحة :  $3x + 5 \leq 2(x + 3)$

$$\text{يعني : } 3x + 5 \leq 2x + 6$$

$$\text{يعني: } 3x - 2x \leq 6 - 5$$

$$\text{يعني: } x \leq 1$$

ادن حلول المترابحة هي جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من أو يساوي 1.

3- لحل جبريا النظمة:

$$\begin{cases} 6x + 7y = 8 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$$

باستعمال طريقة التالية الخطية

$$\begin{cases} 6x + 7y = 8 & \times -1 \\ 3x + 2y = 1 & \times 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -6x - 7y = -8 \\ 6x + 4y = 2 \end{cases}$$

نجمع المعادلتين طرفا بطرف

$$\text{فنجد : } -6x - 7y + 6x + 4y = -8 + 2$$

$$\text{يعني : } -3y = -6$$

$$\text{ادن : } y = \frac{-6}{-3} = 2$$

لدينا دالة تألفية

$$f(x) = mx + b \quad \text{يعني:}$$

$m$  لنحدد :

$$m = \frac{f(0) - f(1)}{0 - 1} \quad \text{بما ان:}$$

$$m = \frac{2 - 1}{-1} = \frac{1}{-1} = -1 \quad \text{يعني:}$$

$$f(x) = -x + b \quad \text{ادن:}$$

$b$  لنحدد:

$$f(1) = 1 \quad \text{لدينا:}$$

$$-1 + b = 1 \quad \text{يعني:}$$

$$b = 1 + 1 \quad \text{يعني:}$$

$$b = 2 \quad \text{يعني:}$$


$$f(x) = -x + 2 \quad \text{ادن:}$$

-2- ليكن  $g$  تمثيل الدالة

لدينا

x	0	1
$g(x)$	0	2

ادن :  $M(1;2) \in (\Delta)$  و  $O(0;0) \in (\Delta)$



ب- الحل المباني للمعادلة  $f(x) = g(x)$  هو أقصول نقطة التقاطع و قيمته التقريرية 0,6

#### التمرين الخامس

1- لتحقق من ان

لدينا مجموع المقابلات 30 مقابلة

$$5+11+x+2x+2=30 \quad \text{يعني:}$$

$$3x+18=30 \quad \text{يعني:}$$

$$3x=30-18 \quad \text{يعني:}$$

$$3x=12 \quad \text{يعني:}$$

$$x=\frac{12}{3}=4 \quad \text{ادن:}$$

ادن : (-2;2)

2- لنبين ان المعادلة المختصرة لل المستقيم ( $JB$ ) هي

$$y=-\frac{1}{2}x+1$$

لنسعد :  $y = mx + p$

: $m$  لنحدد

و بما أن :  $B \in (JB)$  و  $J \in (JB)$

$$m = \frac{y_J - y_B}{x_J - x_B} \quad \text{فإن:}$$

$$m = \frac{1-3}{0--4} \quad \text{يعني:}$$

$$m = \frac{-2}{4} = \frac{-1}{2} \quad \text{ادن:}$$

$$(JB) : y = \frac{-1}{2}x + p \quad \text{و منه:}$$

: $p$  لنحدد

و بما أن :  $J \in (JB)$

$$y_J = \frac{-1}{2}x_J + p \quad \text{فإن:}$$

$$1 = \frac{-1}{2} \times 0 + p \quad \text{يعني:}$$

$$1 = 0 + p \quad \text{يعني:}$$

$$1 = p \quad \text{يعني:}$$

$$(JB) : y = \frac{-1}{2}x + 1 \quad \text{ادن:}$$

$$(JB) : y = \frac{-1}{2}x + 1 \quad \text{و بما ان: } (D) : y = 2x + 6$$

$$m_{(JB)} \times m_{(D)} = 2 \times \frac{-1}{2} = -1$$

فإن : ( $JB$ ) عمودي على ( $D$ )

ب- لنبين ان المستقيم ( $D$ ) واسط القطعة [ $JB$ ]

لتحقق من أن ( $D$ ) يمر (-2;2) من منتصف [ $JB$ ]

$$y_E = 2x_E + 6 \quad \text{يعني:}$$

$$2 = 2 \times -2 + 6 \quad \text{يعني:}$$

$$2 = -4 + 6 \quad \text{يعني:}$$

$$2 = 2 \quad \text{يعني:}$$

ادن : ( $D$ ) يمر (-2;2) من منتصف [ $JB$ ]

و بما ان : ( $JB$ ) متواحد مع ( $D$ )

فإن : ( $D$ ) واسط القطعة [ $JB$ ]

#### التمرين الرابع

1-أ- لدينا من خلال التمثيل :  $f(2)=0$  و  $f(0)=2$

ب- قيمة  $a$  هي :  $a=1$

ج- لنبين أن صيغة الدالة  $f$  هي

## تصحيح الامتحان 07

جهة سوس ماسة درعة يونيو 2009

التمرين الأول

1- لنحل المعادلة :  $3(5x - 2) - 2 = 7x$

لدينا :  $3(5x - 2) - 2 = 7x$

يعني :  $15x - 6 - 2 = 7x$

يعني :  $15x - 8 = 7x$

يعني :  $15x - 7x = 8$

يعني :  $8x = 8$

ادن :  $x = \frac{8}{8} = 1$

وبالتالي : للمعادلة حل وحيد هو

2- لنحل المتراجحة :  $12x + 5 \geq 8x - 5$

لدينا :  $12x + 5 \geq 8x - 5$

يعني :  $12x - 8x \geq -5 - 5$

يعني :  $4x \geq -10$

يعني :  $x \geq \frac{-10}{4}$

يعني :  $x \geq \frac{-5}{2}$

إذن : حلول المعادلة هي جميع الأعداد الحقيقة الأكبر من

أو يساوي  $\frac{-5}{2}$

3- لنحل جبريا النظمة:  $\begin{cases} x + y = 1 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$

$\begin{cases} x = 1 - y \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$  يعني :

$\begin{cases} x = 1 - y \\ 3(1 - y) - 2y = 8 \end{cases}$  يعني :

$\begin{cases} x = 1 - y \\ 3 - 3y - 2y = 8 \end{cases}$  يعني :

$\begin{cases} x = 1 - y \\ -5y = 8 - 3 \end{cases}$  يعني :

$\begin{cases} x = 1 - y \\ -5y = 5 \end{cases}$  يعني :

$\begin{cases} x = 1 - 1 = 2 \\ y = \frac{5}{-5} = -1 \end{cases}$  يعني :

ادن حل النظمة هو الزوج : (2;-1)

التمرين الثاني1- لدينا اكبر حصص هو 12 موافق لقيمة الميزة 20  
ادن المنوال هو 20

2- لدينا :  $M = \frac{5 \times 0 + 11 \times 1 + 4 \times 2 + 8 \times 3 + 2 \times 4}{30}$

يعني :  $M = \frac{0 + 11 + 8 + 24 + 8}{30}$

يعني :  $M = \frac{51}{30}$

ادن :  $M = 1,7$

4	3	2	1	0	عدد الاهداف
2	8	4	11	5	عدد المقابلات
30	28	20	16	5	الحصص المتراكم

3- لدينا نصف الحصص الاجمالي هو :  $\frac{30}{2} = 15$

و انطلاقا من جدول الحصص المتراكم الحصص المترادف من 15 هو 16 الموافق لقيمة الميزة 1

ادن القيمة الوسطية هي 1

التمرين السادس1- النحس V حجم الاسطوانة

لدينا :  $V = \pi \times \left(\frac{AB}{2}\right)^2 \times OO'$

يعني:  $V = 3,14 \times \left(\frac{2}{2}\right)^2 \times 10$

ادن :  $V = 31,4 \text{ cm}^3$

ب- النحس المسافة AO'لدينا '  $OAO'$  مثلث قائم الزاوية في  $O$   
يعني حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة

يعني :  $AO'^2 = OA^2 + OO'^2$

يعني :  $AO'^2 = 1^2 + 10^2$

يعني :  $AO'^2 = 101$

ادن :  $AO' = \sqrt{101}$

2- لدينا :  $V' = \pi \times r^2 \times h$

و لدينا :  $V' = \frac{\pi}{4} r^2 h$

يعني :  $\pi \times r^2 \times h = \frac{\pi \times \left(\frac{AB}{2}\right)^2 \times h}{4}$

يعني :  $\pi \times r^2 \times h = \frac{\pi \times 1^2 \times h}{4}$

يعني :  $\pi \times r^2 \times h = \frac{\pi \times \frac{h}{4}}{4}$

يعني :  $r^2 = \frac{1}{4}$

ادن :  $r = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$

-2

50	30	25	20	dh المساهمة ب
4	7	2	12	عدد التلاميذ

3- لدينا :  $M = \frac{12 \times 20 + 2 \times 25 + 7 \times 30 + 50 \times 4}{25}$

يعني :  $M = \frac{240 + 50 + 210 + 200}{25}$

يعني :  $M = \frac{700}{25}$

ادن :  $M = 28$

التمرين الثالث

1- لدينا :  $f(x) = 3x + 4$

يعني :  $f(0) = 3 \times 0 + 4$

ادن :  $f(0) = 4$

بـ- ليكن  $x$  هو العدد الذي صورته 1 بالدالة  $f$

يعني :  $f(x) = 1$

يعني :  $3x + 4 = 1$

يعني :  $3x = 1 - 4$

يعني :  $3x = -3$

يعني :  $x = \frac{-3}{3} = -1$


و بالتالي العدد هو -1

جـ- التمثيل المباني ( $\Delta$ ) للدالة  $f$  في معلم متعمد منظم

لدينا

x	0	-1
$f(x)$	4	1


اذن: ( $\Delta$ ) يمر من نقطتين  $(0;4)$  و  $(-1;1)$



2- لدينا دالة خطية

يعني :  $g(x) = ax$

و بما ان :  $(D) \parallel (\Delta)$





التمرين الثالث

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x + 5y = 10 \end{cases}$$

لدينا : -1

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ 3x + 5y = 10 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ 3(4 - y) + 5y = 10 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ 12 - 3y + 5y = 10 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ 12 + 2y = 10 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ 2y = 10 - 12 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ 2y = -2 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ y = \frac{-2}{2} = -1 \end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases} x = 4 - -1 = 5 \\ y = -1 \end{cases}$$

يعني :

ادن حل النظمة هو الزوج : (5; -1)


2- لحل المعادلة :  $4x^2 - 9 = 0$ 

$$(2x)^2 - 3^2 = 0$$

$$(2x - 3)(2x + 3) = 0$$

يعني:  $2x - 3 = 0$  او  $2x + 3 = 0$ يعني:  $2x = 3$  او  $2x = -3$ 

$$x = \frac{3}{2} \text{ او } x = \frac{-3}{2}$$

و بالتالي للمعادلة حلان هما  $\frac{3}{2}$  و  $-\frac{3}{2}$ التمرين الرابع

$$M = \frac{2 \times 10 + 3 \times 11 + 5 \times 12 + 4 \times 13 + 5 \times 14 + 6 \times 15}{25}$$

$$M = \frac{20 + 33 + 60 + 52 + 70 + 90}{25}$$

$$M = \frac{325}{25}$$

$$M = 13$$

3- عدد الأعضاء الذين عمرهم اكبر من أو يساوي 13

$$6+5+4=15$$

التمرين الثاني

$$f(x) = \frac{3}{2}x$$

$$f(2) = \frac{3}{2} \times 2 = \frac{6}{2}$$

$$f(2) = 3$$

$$g(x) = -3x + 9$$

$$g(2) = -3 \times 2 + 9$$

$$g(3) = -6 + 9 = 3$$

2- ليكن  $x$  هو العدد الذي صورته 5 بالدالة  $g$ 

$$g(x) = 5$$

$$-3x + 9 = 5$$

$$-3x = 5 - 9$$

$$-3x = -4$$

$$x = \frac{-4}{-3} = \frac{4}{3}$$


و بالتالي العدد هو  $\frac{4}{3}$ 

-3

$g(x) = -3x + 9$	$f(x) = \frac{3}{2}x$
$x$	0
$g(x)$	9
$f(x)$	0

ادن تمثيل  $f$  يمر من  $A(2;3)$  و  $B(3;0)$

ادن تمثيل  $f$  يمر من  $A(2;3)$  و  $O(0;0)$



$$0=b \quad \text{يعني:} \\ (\Delta) \quad : \quad y=x \quad \text{اذن:} \\ \text{5- ب}$$

$$(CD) \quad : \quad y=cx+d \quad \text{لنصع:} \\ \text{لحدد: } c$$

و بما أن  $(AB) \parallel (CD)$  : لأن صورة مستقيم بازاحة هو مستقيم يوازيه

$$m_{(CD)} = m_{(AB)} \quad \text{فإن:}$$

$$m_{(AB)} = -1 \quad \text{و بما ان:}$$

$$c = -1 \quad \text{اي} \quad m_{(CD)} = -1 \quad \text{فإن:}$$

$$(CD) \quad : \quad y = -x + d \quad \text{و منه:} \\ \text{لحدد: } d$$

$$\text{و بما ان: } C \in (CD)$$

$$y_C = -x_C + b \quad \text{فإن:}$$

$$2 = -2 + d \quad \text{يعني:}$$

$$2 + 2 = d \quad \text{يعني:}$$

$$4 = d \quad \text{يعني:}$$

$$(CD) \quad : \quad y = -x + 4 \quad \text{اذن:}$$

### التمرين الخامس

1- لدينا  $(BF) \perp (FE)$  و  $(BF) \perp (FG)$

و بما ان  $(FG)$  و  $(FE)$  يتقاطعان في

$$(BF) \perp (EFG) \quad \text{يعني:}$$

و بما ان  $(HF)$  ضمن المستوى  $(EFG)$  و مار من  $F$

$$\text{فإن: } (BF) \perp (HF)$$

يعني  $HBF$  مثلث قائم الزاوية في  $F$

يعني حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة

$$HB^2 = FB^2 + FH^2 \quad \text{يعني:}$$

و لدينا  $HEF$  مثلث قائم الزاوية في  $F$

يعني حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة

$$FH^2 = EF^2 + EH^2 \quad \text{يعني:}$$

$$HB^2 = FB^2 + EF^2 + EH^2 \quad \text{يعني:}$$

$$HB^2 = 6^2 + 6^2 + 6^2 \quad \text{يعني:}$$

$$HB^2 = 3 \times 6^2 \quad \text{يعني:}$$

$$HB = \sqrt{3 \times 6^2} \quad \text{يعني:}$$

$$HB = 6\sqrt{3} \quad \text{اذن:}$$

2- لدينا  $(HD) \perp (ADC)$

يعني  $(HD)$  ارتفاع للهرم

$$V_{HABD} = \frac{1}{3} \times HD \times S_{ABD} \quad \text{يعني:}$$

$$V_{HABD} = \frac{1}{3} \times 6 \times \frac{6 \times 6}{2} \quad \text{يعني:}$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} \quad \text{2- لدينا:}$$

$$AC = \sqrt{(2 - -2)^2 + (2 - 1)^2} \quad \text{يعني:}$$

$$AC = \sqrt{16 + 1} \quad \text{يعني:}$$

$$AC = \sqrt{17} \quad \text{ادن:}$$

$$E\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right) \quad \text{3- لدينا:}$$

$$E\left(\frac{-2 + 1}{2}; \frac{1 + -2}{2}\right) \quad \text{يعني:}$$

$$E\left(\frac{-1}{2}; \frac{-1}{2}\right) \quad \text{ادن:}$$

4- لتحديد المعادلة المختصرة ل  $(AB)$

$$(AB) \quad : \quad y = mx + p \quad \text{لنصع:} \\ \text{لحدد: } m$$

و بما ان  $A \in (AB)$  و  $B \in (AB)$

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad \text{فإن:}$$

$$m = \frac{-2 - 1}{1 - -2} \quad \text{يعني:}$$

$$m = \frac{-3}{3} = -1 \quad \text{اذن:}$$

$$(AB) \quad : \quad y = -x + p \quad \text{و منه:}$$

لحدد:  $p$

و بما ان:  $A \in (AB)$

$$y_A = -1 \times x_A + p \quad \text{فإن:}$$

$$1 = -1 \times -2 + p \quad \text{يعني:}$$

$$1 = 2 + p \quad \text{يعني:}$$

$$1 - 2 = p \quad \text{يعني:}$$

$$-1 = p \quad \text{يعني:}$$

$$(AB) \quad : \quad y = -x - 1 \quad \text{اذن:}$$

b- لنصع:  $(\Delta) \quad : \quad y = ax + b$

لحدد:  $a$

$$(AB) \perp (\Delta) \quad \text{و بما ان:}$$

$$m_{(AB)} \times m_{(\Delta)} = -1 \quad \text{فإن:}$$

$$-1 \times m_{(\Delta)} = -1 \quad \text{يعني:}$$

$$a = 1 \quad \text{اي} \quad m_{(\Delta)} = \frac{-1}{-1} = 1 \quad \text{اذن:}$$

$$(\Delta) \quad : \quad y = x + b \quad \text{و منه:}$$

لحدد:  $b$

و بما ان:  $E \in (\Delta)$

$$y_E = x_E + b \quad \text{فإن:}$$

$$\frac{-1}{2} = \frac{-1}{2} + b \quad \text{يعني:}$$

$$\text{لحل النظمة: } \begin{cases} x + y = 15 \\ 2x + y = 21 \end{cases}$$

$$\text{لدينا: } \begin{cases} x + y = 15 \\ 2x + y = 21 \end{cases}$$

$$\text{يعني: } \begin{cases} y = 15 - x & (1) \\ 2x + y = 21 & (2) \end{cases}$$

$$\text{نجد: } \begin{cases} y = 15 - x \\ 2x + 15 - x = 21 \end{cases}$$

$$\text{يعني: } \begin{cases} y = 15 - x \\ x + 15 = 21 \end{cases}$$

$$\text{يعني: } \begin{cases} y = 15 - x \\ x = 21 - 15 \end{cases}$$

$$\text{يعني: } \begin{cases} y = 15 - x \\ x = 6 \end{cases}$$

$$\text{يعني: } \begin{cases} y = 15 - 6 \\ x = 6 \end{cases}$$

$$\text{اذن: } \begin{cases} y = 9 \\ x = 6 \end{cases}$$

ومنه الزوج (6;9) هو حل النظمة

### التمرين الثاني

1- منوال المتسلسلة :

قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص هي الميزة 30 ذات الحصيص 7

إذن المنوال هو 30

-القيمة الوسطية :

قيم الميزة					
50	30	25	20	10	الحصيص
3	7	5	4	6	الحصيص المترافق
25	22	15	10	6	

نصف الحصيص الإجمالي =  $12.5 = \frac{1}{2} \times 25$

الحصيص المترافق الأكبر مباشرة من 12.5 هو الذي قيمته

15 الموافق لقيمة الميزة 25

إذن القيمة الوسطية هي 25

$$M = \frac{10 \times 6 + 20 \times 4 + 25 \times 5 + 7 \times 30 + 3 \times 50}{25} \quad \text{لدينا: } 2$$

$$M = \frac{60 + 80 + 125 + 210 + 150}{25} \quad \text{يعني:}$$

$$M = \frac{265 + 360}{25} \quad \text{يعني:}$$

$$M = \frac{625}{25} \quad \text{يعني:}$$

$$M=25 \quad \text{اذن:}$$

$$\text{اذن: } V_{HABD} = 36 \text{ cm}^3$$

$$\text{3- لدينا الهرم } HJK \text{ تصغير للهرم } HABD \text{ نسبيته} \frac{HD}{HI} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$S_{IJK} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times S_{ABD} : \text{يعني:}$$

$$S_{IJK} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{6 \times 6}{2} : \text{يعني:}$$

$$S_{IJK} = \frac{1}{9} \times \frac{36}{2} : \text{يعني:}$$

$$S_{IJK} = \frac{36}{18} = 2 \text{ cm}^2 : \text{اذن:}$$

### التمرين السادس

ليكن  $x$  هو عدد المبيعات من آلات المنزلية

$$40x > 285 \quad \text{يعني: } 40x < 285$$

$$40x - 1995 > 0 \quad \text{يعني: } 40x > 1995$$

$$40x > 1995 \quad \text{يعني: } x > \frac{1995}{40}$$

$$x > \frac{1995}{40} \quad \text{يعني: } x > 49.875$$

وبالتالي الحد الأدنى من المبيعات يجب أن يصل 50 آلة

### تصحيح الامتحان 09

جهة سوس ماسة درعة يونيو 2007

#### التمرين الأول

1- لنحل المعادلة :  $3x + 1 = 2 - x$

لدينا :  $3x + 1 = 2 - x$

يعني:  $3x + x = 2 - 1$

يعني:  $4x = 1$

$$\text{اذن: } x = \frac{1}{4}$$

وبالتالي : للمعادلة حل وحيد هو  $\frac{1}{4}$

2- لنحل المترابطة :  $6x - 1 \leq 2x - 5$

لدينا:  $6x - 1 \leq 2x - 5$

يعني:  $6x - 2x \leq -5 + 1$

يعني:  $4x \leq -4$

$$\text{يعني: } x \leq \frac{-4}{4}$$

ومنه:  $x \leq -1$

اذن: حلول المعادلة هي جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من أو يساوي -1

$$(AB) : y = \frac{1}{2}x + p \quad \text{ومنه:}$$

لنحدد  $p$   
و بما أن  $A \in (AB)$  فإن  $y_A = \frac{1}{2}x_A + p$   
يعني  $-1 = \frac{1}{2} \times 2 + p$   
يعني  $p = -2$

$$(AB) : y = \frac{1}{2}x - 2 \quad \text{اذن:}$$

بـ لنبين أن  $(AB) \perp (\Delta)$

$$(AB) : y = \frac{1}{2}x - 2 \quad \text{لدينا:}$$

$$(\Delta) : y = -2x + 3 \quad \text{و}$$

يعني  $\frac{1}{2} \times -2 = -1$   
يعني جداء الميلين يساوي -1  
اذن:  $(AB) \perp (\Delta)$

#### التمرين الرابع:

##### الجزء الأول

-1 دالة خطية يعني أن تمثيلها ( $d$ ) يمر من أصل المعلم

وبما أن  $f(2) = 1$  فإن  $f(x) = ax$

-2 دالة خطية يعني  $f(x) = \frac{f(x)}{x} = \frac{f(2)}{2} = \frac{1}{2}$

وبما أن  $f(x) = \frac{1}{2}x$  اذن:

##### الجزء الثاني

-1 لنحدد العدد الذي صورته ب  $g$  هي -1

لدينا:  $g(x) = \frac{1}{2}x - 2$

ليكن  $z$  هو العدد الذي صورته ب  $g$  هي -1

يعني:  $g(z) = -1$

$\frac{1}{2}z - 2 = -1$  يعني:

$$\frac{1}{2}z = -1 + 2$$

$$\frac{1}{2}z = 1 \quad \text{يعني:}$$

$$z = 2 \quad \text{اذن:}$$

العدد هو 2

-2

x	0	2
$g(x)$	-2	-1

اذن:  $A(2; -1) \in (\Delta)$  و  $C(0; -2) \in (\Delta)$

#### التمرين الثالث

1- لدينا معادلة المستقيم:  $y = -2x + 3$

لدينا:  $A(2, -1)$  يعني  $A \in (\Delta)$

يعني:  $-1 = -2 \times 2 + 3$   
اذن:  $-1 = -1$  وبالتالي  $A \in (\Delta)$

اذن:  $B(4, 0)$  يعني  $B \in (\Delta)$

يعني:  $0 = -2 \times 4 + 3$   
اذن:  $0 = -5$  وهذا غير صحيح وبالتالي  $B \notin (\Delta)$

بـ لنحدد احدى ثلثي منتصف  $[AB]$  لكن  $M$  منتصف  $[AB]$

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{يعني:}$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

$$x_M = \frac{2+4}{2} \quad \text{يعني:}$$

$$y_M = \frac{-1+0}{2}$$

$$x_M = 3 \quad \text{يعني:}$$

$$y_M = \frac{-1}{2}$$

$$M\left(3; \frac{-1}{2}\right) \quad \text{اذن:}$$

AB

لدينا:  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

$$AB = \sqrt{(4-2)^2 + (0-(-1))^2} \quad \text{يعني:}$$

$$AB = \sqrt{(2)^2 + (1)^2} \quad \text{يعني:}$$

$$AB = \sqrt{5} \quad \text{اذن:}$$

2- لنحدد المعادلة المختصرة ل  $(AB)$

لنضع:  $y = mx + p$   
لنحدد  $m$

وبما أن  $B \in (AB)$  و  $A \in (AB)$

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad \text{فإن:}$$

$$m = \frac{0 - (-1)}{4 - 2} \quad \text{يعني:}$$

$$m = \frac{1}{2} \quad \text{اذن:}$$

$$V = \frac{1}{3} SH \times S_{ABCD} - \frac{1}{3} IH \times S_{ABCD}$$

يعني :

$$V = \frac{1}{3} S_{ABCD} (SH - IH)$$

يعني :

وبما أن : I منتصف [SH]

$$IH = \frac{SH}{2}$$

$$V = \frac{1}{3} S_{ABCD} (SH - \frac{SH}{2})$$

ومنه :

$$V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \times \frac{SH}{2}$$

يعني :

$$V = \frac{1}{6} S_{ABCD} \times SH$$

يعني :

$$V = \frac{1}{6} AB^2 \times SH$$

يعني :

$$V = \frac{1}{6} \times 6^2 \times 8$$

ومنه :

$$V = 48 \text{ cm}^3$$

اذن :

2- اذا اعتبرنا المجسم الاصلي حجمه

$$\frac{1}{10}$$

والجسم (P) تصغير له بنسبة

$$V = \left( \frac{1}{10} \right)^3 \times V_3$$

فإن :

$$V = \frac{1}{1000} \times 48000$$

يعني :

$$V = 48 \text{ cm}^3$$



يعني :

وهذا صحيح

اذن المجسم الاصلي حجمه  $V_3 = 48000 \text{ cm}^3$

$$\frac{1}{10}$$

هو تصغير للمجسم (P) بنسبة



-3

$$g(x) = \frac{1}{2}x - 2 \quad \text{و} \quad f(x) = \frac{1}{2}x$$

يعني : لدلتان نفس المعامل الموجة أي ان المستقيمان (d) و (Δ) متوازيان

وبما ان  $O(0;0) \in (d)$  و  $A(2;-1) \in (\Delta)$  و الازاحة المعتمدة هي الازاحة التي تحول O الى A فان صورة أي نقطة من (d) تنتهي الى (Δ)

وبما ان  $B(2;1) \in (d)$  فان صورتها تنتهي الى (Δ)

### طريقة ثانية

لدينا الازاحة التي تحول O الى  $\overrightarrow{OA}$ .

يعني المتجهة الممثلة لهذه الازاحة :

لتكن  $R(x;y)$  هي صورة  $\overrightarrow{OA}$

يعني :

$$\overrightarrow{OA}(x_A - x_O; y_A - y_O).$$

يعني :

$$\overrightarrow{OA}(2;-1).$$

وبما أن :

$$\overrightarrow{BR}(x_R - x_B; y_R - y_B).$$

يعني :

$$\overrightarrow{BR}(x - 2; y - 1).$$

يعني :

$$y - 1 = -1 \quad x - 2 = 2$$

يعني :

$$y = 0 \quad x = 4$$

اذن :

$$R(4;0)$$

وبما أن :

$$R(4;0) \in (\Delta)$$

### التمرين الخامس

1- احسب V حجم المجسم (P) ليكن  $V_1$  حجم الهرم

$$V_1 = \frac{1}{3} SH \times S_{ABCD}$$

يعني :

IAabcd حجم الهرم

$$V_2 = \frac{1}{3} IH \times S_{ABCD}$$

يعني :

$V = V_1 - V_2$  وبما أن :

$$\begin{cases} 3x + 5y = 72 \\ x + y = 20 \end{cases}$$

وبالتالي :

نعلم حسب ما سبق حل هذه النظمة :  $x=14$  و  $y=6$   
إذن عدد الأطفال هو 14 و عدد الكبار هو 6

### التمرين الثاني

#### 1- أ- لنحدد الدالة الخطية $f$

أي :  $f(2)=3$

ليكن  $a$  معامل  $f$

$$a = \frac{f(2)}{2} = \frac{3}{2}$$

ومنه

$f(-3) :$

$$f(x) = \frac{3}{2}x$$

لدينا

$$f(-3) = \frac{3}{2} \times -3 = \frac{-9}{2}$$

يعني :

ج- ليكن  $x$  هو العدد الذي صورته  $f$  هي  $\frac{-3}{5}$

$$f(x) = \frac{-3}{5}$$

يعني :

$$\frac{3}{2}x = \frac{-3}{5}$$

ومنه :

$$x = \frac{-3}{5} \times \frac{2}{3}$$

يعني :

$$x = \frac{-2}{5}$$

اذن :

منه  $\frac{-2}{5}$  هو العدد الذي صورته هي  $f$  بـ  $\frac{-3}{5}$

2- ا- لنحسب  $g(-1)$

$$g(x) = 2x + 3$$

لدينا :

$$g(-1) = 2 \times -1 + 3 = 1$$

يعني :

لنسحب  $g(0)$

$$g(x) = 2x + 3$$

لدينا :

$$g(0) = 2 \times 0 + 3 = 3$$


يعني :

ب- التمثيل المباني لـ  $g$

$$g(0) = 3$$

لدينا

وبالتالي تمثيل  $g$  هو المستقيم المار من النقطتين  $A(0,3)$  و  $B(-1,1)$



### تصحيح الامتحان 10

جهة دكالة عبدة يونيو 2007

#### التمرين الأول

$$\frac{2x}{3} - \frac{5}{6} = x - \frac{3}{2}$$

أ- نحل المعادلة :

$$\frac{4x}{6} - \frac{5}{6} = \frac{2x}{2} - \frac{3}{2}$$

يعني :

$$\frac{4x - 5}{6} = \frac{2x - 3}{2}$$

يعني :

$$2(4x - 5) = 6(2x - 3)$$

يعني :

$$8x - 10 = 12x - 18$$

يعني :

$$8x - 12x = -18 + 10$$

يعني :

$$-4x = -8$$

يعني :

$$x = \frac{-8}{-4} = 2$$

يعني :

حل المعادلة الوحيدة هو 2

ب- نحل المترابطة :

$$2 - 3x > x + 7$$

يعني :

$$-3x - x > 7 - 2$$

يعني :

$$-4x > 5$$

يعني :

$$x < -\frac{5}{4}$$

يعني :

حلول المترابطة هي جميع الأعداد الحقيقة الأصغر قطعاً من

$$-\frac{5}{4}$$

$$\begin{cases} 3x + 5y = 72 \\ x + y = 20 \end{cases}$$

2- أ- نحل النظمة :

$$\begin{cases} 3x + 5y = 72 \\ x + y = 20 \end{cases}$$

لدينا :

$$\begin{cases} 3x + 5y = 72 \\ x + y = 20 \end{cases} \times (1)$$

يعني :

$$\begin{cases} 3x + 5y = 72 \\ 3x + 3y = 60 \end{cases} \times (3)$$

يعني :

$$\begin{cases} 3x + 5y = 72 \\ 3x + 3y = 60 \end{cases}$$

نطرح السطر الثاني من الأول :

$$3x + 5y - (3x + 3y) = 72 - 60$$

$$3x + 5y - 3x - 3y = 12$$

يعني :

$$2y = 12$$

يعني :

$$y = 6$$

يعني :

نعرض  $y = 6$  بقيمتها في إحدى المعادلتين الأصلتين :

$$x + 6 = 20$$

$$x = 14$$

اذن :

ومنه الزوج  $(14; 6)$  هو حل النظمة

ب- ليكن  $x$  هو واجب زيارة الصغار و  $y$  واجب زيارة الكبار

نعلم مجموع الزوار هو 20 أي :  $x+y=20$

وقد أدى 20 زائر 72 درهم أي :  $3x+5y=72$



$$x \leq \frac{-12}{2} \quad \text{يعني :}$$

$$x \leq -6 \quad \text{يعني :}$$

حلول المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقة الأصغر أو يساوي من -6

a- لحل النظمة

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ x + 4y = 32 \end{cases} \quad \text{لدينا :}$$

$$\begin{cases} x = 14 - y \\ x + 4y = 32 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} x = 14 - y \\ 14 - y + 4y = 32 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} x = 14 - y \\ 3y = 32 - 14 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} x = 14 - y \\ 3y = 18 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} x = 14 - y \\ y = 6 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} x = 8 \\ y = 6 \end{cases} \quad \text{اذن :}$$

وبالتالي حل النظمة هو الزوج (8,6)

b- ليكن x عدد العلب من صنف 125 غ و y عدد العلب من صنف 500 غ

الوزن ب الغرام يعبر عنه ب

$$\text{يعني : } x \times 125 + y \times 500 = 4000$$

$$\frac{x \times 125 + y \times 500}{125} = \frac{4000}{125} \quad \text{يعني :}$$

$$\frac{x \times 125}{125} + \frac{y \times 500}{125} = \frac{4000}{125} \quad \text{يعني :}$$

$$x + 4y = 32 \quad \text{يعني :}$$

ونعلم ان مجموع القطع هو 14

$$\text{يعني : } x + y = 14$$

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ x + 4y = 32 \end{cases} \quad \text{و بالتالي نحصل على :}$$

حلها الزوج (8,6)

وبالتالي عدد العلب من صنف 125 غ هو 8 وعدد العلب من الصنف 500 غ هو 6

### التمرين الثاني

a1- لنحدد المعادلة المختصرة ل (AB)

$$(AB) : y = mx + p \quad \text{لنصع : } m \quad \text{لنحدد}$$

و بما أن :  $B \in (AB)$  و  $A \in (AB)$

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad \text{فإن :}$$

$$\overrightarrow{EF}(2-6;5-3) \quad \text{يعني :}$$

$$\overrightarrow{EF}(-4;2) \quad \text{اذن :}$$

$$\begin{cases} x_{H'} - 2 = -4 \\ y_{H'} = 2 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$\begin{cases} x_{H'} = -2 \\ y_{H'} = 2 \end{cases} \quad \text{يعني :}$$

$$H'(-2;2) \quad \text{اذن :}$$

### التمرين السادس

1--المنسوب CH لدينا المثلث HGC مثلث قائم الزاوية في G

$$CH^2 = HG^2 + GC^2 \quad \text{لدينا}$$

$$CH^2 = 3^2 + 4^2 \quad \text{يعني :}$$

$$CH^2 = 9 + 16 = 25 \quad \text{يعني :}$$

$$CH = 5 \quad \text{اذن :}$$

b- لنحسب حجم الهرم HABCD

لدنيا (HD) ارتفاع للهرم

$$V_{HABCD} = \frac{1}{3} \times HD \times S_{ABCD} \quad \text{يعني :}$$

$$V_{HABCD} = \frac{1}{3} \times 3 \times (4 \times 4) \quad \text{يعني :}$$

$$V_{HABCD} = 16 \text{ cm}^3 \quad \text{اذن :}$$

2- لنحدد k معامل التكبير

لدينا HA'B'C'D' تكبير ل ABCD

$$S_{A'B'C'D'} = k^2 \times S_{ABCD} \quad \text{يعني :}$$

$$k^2 = \frac{S_{A'B'C'D'}}{S_{ABCD}} \quad \text{يعني :}$$

$$k^2 = \frac{48}{16} \quad \text{يعني :}$$

$$k^2 = 3 \quad \text{يعني :}$$

$$k = \sqrt{3} \quad \text{اذن :}$$

### تصحيح الامتحان 11

### جهة مراكش تانسيفت الحوز

يونيو 2007

### التمرين الأول

1- لحل المعادلة :  $3(x-2) + 5x = 10$

$$3x - 6 + 5x = 10 \quad \text{يعني : } 3x - 6 + 5x = 10$$

$$8x = 10 + 6 \quad \text{يعني : } 8x = 10 + 6$$

$$8x = 16 \quad \text{يعني : } 8x = 16$$

$$x = \frac{16}{8} = 2 \quad \text{يعني : } x = \frac{16}{8} = 2$$


حل المعادلة الوحيد هو 2

2- لحل لمتراجحة  $4x + 7 \leq 2x - 5$

$$4x - 2x \leq -7 - 5 \quad \text{يعني : } 4x - 2x \leq -7 - 5$$

$$2x \leq -12 \quad \text{يعني : } 2x \leq -12$$

اذن :  $C(-3;4)$   
- التمثيل

**التمرين الثالث:**

$$f(0)=2 \quad \text{و} \quad f(-2)=-1 \quad \text{-a -1}$$

$$f(-1) < g(-1) \quad \text{-b}$$

$$f(0)=2 \quad \text{و} \quad f(-2)=-1 \quad \text{- لدينا :}$$

$$f(x)=ax+b \quad \text{لدينا :}$$

$$a=\frac{f(-2)-f(0)}{-2-0} \quad \text{ومنه :}$$

$$a=\frac{-1-2}{-2-0}=\frac{3}{2} \quad \text{يعني :}$$

$$f(x)=\frac{3}{2}x+b \quad \text{ومنه :}$$

$$f(0)=\frac{3}{2}\times 0+b=2 \quad \text{لدينا :}$$

$$b=2 \quad \text{يعني :}$$

$$f(x)=\frac{3}{2}x+2 \quad \text{اذن :}$$

للتتمم الجدول : 3

x	-4	-2	-10
$g(x)$	6	3	15

لحساب صورة العدد -10

$$g(-4)=6 \quad \text{لدينا :}$$

و  $g(x)=mx$  دالة خطية يعني :

$$m=\frac{g(x)}{x}=\frac{g(-4)}{-4}=\frac{6}{-4}=\frac{-3}{2} \quad \text{يعني :}$$

$$g(x)=\frac{-3}{2}x \quad \text{اذن :}$$

$$g(-10)=\frac{-3}{2}\times -10=15 \quad \text{اذن :}$$

$$m=\frac{0-2}{5-1} \quad \text{يعني :}$$

$$m=\frac{-2}{4}=\frac{-1}{2} \quad \text{اذن :}$$

$$(AB) \quad : \quad y=\frac{-1}{2}x+p \quad \text{ومنه :}$$

$$\text{لحدد } p : A \in (AB) \quad \text{وبما أن :}$$

$$y_A=\frac{-1}{2}x_A+p \quad \text{فإن :}$$

$$2=\frac{-1}{2}\times 1+p \quad \text{يعني :}$$

$$\frac{5}{2}=p \quad \text{يعني :}$$

$$(AB) \quad : \quad y=\frac{-1}{2}x+\frac{5}{2} \quad \text{اذن :}$$

$$y=2x \quad \text{- لدينا :}$$

$$(AO) \quad : \quad y=m'x+p' \quad \text{لنسع :}$$

$$m'=\frac{y_O-y_A}{x_O-x_A} \quad \text{فإن :}$$

$$m'=\frac{0-2}{0-1} \quad \text{يعني :}$$

$$m'=2 \quad \text{اذن :}$$

$$(AO) \quad : \quad y=2x+p' \quad \text{ومنه :}$$

$$O \in (AO) \quad \text{وبما أن :}$$

$$y_O=2x_O+p' \quad \text{فإن :}$$

$$0=2\times 0+p' \quad \text{يعني :}$$

$$0=p' \quad \text{يعني :}$$

$$(AO) \quad : \quad y=2x \quad \text{اذن :}$$

$$(AB) \quad : \quad y=\frac{-1}{2}x+\frac{5}{2} \quad \text{- لدينا :}$$

$$(AO) \quad : \quad y=2x \quad \text{و}$$

$$\frac{-1}{2}\times 2=-1 \quad \text{وبما ان :}$$

$$(AO) \perp (AB) \quad \text{فإن :}$$

$$\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AC} \quad \text{يعني : [BC] A -3}$$

$$\overrightarrow{BA}(x_A-x_B; y_A-y_B) \quad \text{لدينا :}$$

$$\overrightarrow{BA}(1-5; 2-0) \quad \text{يعني :}$$

$$\overrightarrow{BA}(-4; 2) \quad \text{اذن :}$$

$$\overrightarrow{AC}(x_C-x_A; y_C-y_A) \quad \text{و}$$

$$\overrightarrow{AC}(x_C-1; y_C-2) \quad \text{يعني :}$$

$$x_C-1=-4 ; y_C-2=2 \quad \text{يعني :}$$

$$x_C=-3 ; y_C=4 \quad \text{يعني :}$$

## -1 - لحساب حجم الهرم EADM

$$V_{EADM} = \frac{1}{3} \times AE \times S_{ADM}$$

لدينا :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$$V_{EADM} = \frac{1}{3} \times 6 \times \frac{3 \times 6}{2}$$

يعني :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$$V_{EADM} = 18 \text{ cm}^3$$

اذن :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

## -2 - لحساب AM

لدينا المثلث DAM

$$AM^2 = DM^2 + AD^2$$

اذن:  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$$AM^2 = 6^2 + 3^2$$

يعني:  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$$AM^2 = 36 + 9 = 45$$

يعني:  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$$AM = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

اذن :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

لدينا (AE) عمودي على (ADM)

يعني: (AE) عمودي على (AM)

$$ME^2 = AM^2 + AE^2$$

اذن :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$$ME^2 = \sqrt{45^2 + 6^2} = 45 + 36 = 81$$

يعني:  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$$ME = \sqrt{81} = 9$$

اذن :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

**تصحيح الامتحان 12****جهة مكناس تافيلالت****يونيو 2007****التمرين الأول**

$$\frac{x-1}{3} + \frac{x+1}{4} = \frac{1}{2}$$

أ- لحل المعادلة:

$$\frac{4(x-1) + 3(x+1)}{3 \times 4} = \frac{1}{2}$$

يعني :

$$\frac{4x-4+3x+3}{12} = \frac{1}{2}$$

يعني :

$$\frac{7x-1}{12} = \frac{1}{2}$$

يعني :

$$2(7x-1) = 1 \times 12$$

يعني :

$$14x - 2 = 12$$

يعني :

$$14x = 12 + 2$$

يعني :

$$x = \frac{14}{14} = 1$$

يعني :

حل المعادلة الوحيد هو 1

$$B- لحل المعادلة : x^2 - \frac{1}{4} = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0$$

يعني :

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) = 0$$

يعني :

$$\left(x - \frac{1}{2}\right) = 0 \quad \text{او} \quad \left(x + \frac{1}{2}\right) = 0$$

يعني :


$$x = \frac{1}{2} \quad \text{او} \quad x = \frac{-1}{2}$$

يعني :

**التمرين الرابع**1- لدينا ABCD متوازي الاضلاع  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ يعني:  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ 

و بالتالي C هي صورة D بالإزاحة ذات المتجهة.

-2

3- لدينا I منتصف [AC]  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$ يعني :  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$ 

اذن: C هي صورة I بالإزاحة ذات المتجهة.

لدينا M هي صورة B بالإزاحة ذات المتجهة.

و لدينا N هي صورة D بالإزاحة ذات المتجهة.

وبما ان النقط D و I و B مستقيمية فان C و M و N مستقيمية لأن الإزاحة تحافظ على استقامة النقط

**التمرين الخامس:**

1- منوال المتسلسلة هو العمر : 12

-2


قيمة الميزة	16	15	14	13	12	11
الحصص	10	5	10	5	15	5
مجموع مراكم	50	40	35	25	20	5

3- لحساب معدل الأعمار M

$$M = \frac{5 \times 11 + 12 \times 15 + 13 \times 5 + 14 \times 10 + 15 \times 5 + 16 \times 10}{50}$$

$$M = 13.5$$

يعني :

**التمرين السادس:**

لنعرض بادهاتي  $B$  في معادلة (D)

$$2 = -1 + 3$$

$$2 = 2$$

يعني:  $B$  تنتهي إلى (D)

وبالتالي  $B$  منتصف  $[BC]$

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} \quad \text{لدينا:}$$

$$y_M = \frac{y_B + y_C}{2}$$

$$x_M = \frac{1+(-1)}{2} \quad \text{يعني:}$$

$$y_M = \frac{4+2}{2}$$

$$x_M = 0 \quad \text{ومنه:}$$

$$y_M = 3$$

اذن:  $M=I$

أي  $I$  منتصف  $[BC]$

3- لنحسب  $AB$  و  $AC$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \quad \text{لدينا:}$$

$$AB = \sqrt{(1-2)^2 + (2-5)^2} \quad \text{يعني:}$$

$$AB = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2} \quad \text{يعني:}$$

$$AB = \sqrt{10} \quad \text{اذن:}$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} \quad \text{لدينا:}$$

$$AC = \sqrt{(-1-2)^2 + (4-5)^2} \quad \text{يعني:}$$

$$AC = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2} \quad \text{يعني:}$$

$$AC = \sqrt{10} \quad \text{اذن:}$$

$$AC = AB \quad \text{ومنه:}$$

وبالتالي المثلث  $ABC$  متساوي الساقين

4- لنحدد معادلة المستقيم ( $\Delta$ ) العمودي على (D)

$$\text{لدينا: } (D) : y = -x + 3$$

$$(\Delta) : y = ax + b$$

لدينا:  $(\Delta) \perp (D)$

$$a \times -1 = -1$$

$$a = \frac{-1}{-1} = 1 \quad \text{يعني:}$$

$$(\Delta) : y = x + b \quad \text{و بالتالي:}$$

$$I(0,3) \in (\Delta) \quad \text{و بما ان:}$$

$$\text{فإن: } y_I = x_I + b$$

$$3 = 1 \times 0 + b$$

$$3 = b \quad \text{يعني:}$$

$$(\Delta) : y = x + 3 \quad \text{ومنه:}$$

للمعادلة حلان هما  $\frac{1}{2}$  و  $-\frac{1}{2}$

5- لحل لمراجحة  $-5x + 3 \leq 0$

$$-5x \leq -3$$

$$x \geq \frac{-3}{-5}$$

$$x \geq \frac{3}{5} \quad \text{يعني:}$$

حلول المراجحة هي جميع الأعداد الحقيقة الاكبر او

$$\text{يساوي من } \frac{3}{5}$$

3- ليكن  $x$  هو الصنف الاول و  $y$  الصنف الثاني

$$\begin{cases} x + y = 45 \\ x = \frac{2}{3}y \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} \frac{2}{3}y + y = 45 \\ x = \frac{2}{3}y \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} \frac{5y}{3} = 45 \\ x = \frac{2}{3}y \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} y = 45 \times \frac{3}{5} \\ x = \frac{2}{3}y \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} y = 27 \\ x = \frac{2}{3}y \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} y = 27 \\ x = \frac{2}{3} \times 27 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} y = 27 \\ x = 18 \end{cases} \quad \text{اذن}$$

عدد كرات الصنف الأول هو 18 و الصنف الثاني هو 27

### التمرين الثاني

$$\text{لدينا: } (D) : y = -x + 3$$

لنعرض بادهاتي  $A$  في معادلة (D)

$$5 = -2 + 3$$

$$5 = 1 \quad \text{يعني:}$$

وبالتالي  $A$  لا تنتهي إلى (D)

$$a = \frac{g(x)}{x} = \frac{g\left(\frac{1}{3}\right)}{\frac{1}{3}} = \frac{-4}{\frac{1}{3}} = -12$$


ومنه :  $a = -12$

$$g(x) = -12x$$

التمرين الخامس

اذن :

-1



2- لدينا ABCD مربع

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

يعني : وبالتالي C هي صورة D بالإزاحة t

3- لنبين ان :  $(EB) \perp (EC)$ 

لدينا C هي صورة D بالإزاحة t


و لدينا E هي صورة O بالإزاحة t

و لدينا B هي صورة A بالإزاحة t

وبالتالي C هي صورة  $A \hat{O} D$  بالإزاحة t

وبما ان قطر المربع متعمدان

$$\angle AOD = 90^\circ$$

ومنه  $\angle BEC = 90^\circ$ التمرين السادس

$$IC = 4\sqrt{5}$$

1-- لنبين ان :  $BIC$  مربع يعني ان المثلث  $BIC$  قائم الزاوية في  $B$ 

$$BI^2 = BC^2 + CI^2$$

$$CI^2 = 8^2 + 4^2$$

$$BI^2 = 8^2 + 4^2$$

التمرين الثالث

1- لنحسب المعدل الحسابي M

$$M = \frac{4 \times 2 + 8 \times 3 + 12 \times 4 + 16 \times 5 + 20 \times 6}{20}$$

$$M = \frac{280}{20} = 14$$

اذن:

2- لنحدد القيمة الوسطية

20	16	12	8	4	قيمة الميزة
6	5	4	3	2	الحصيص
20	14	9	5	2	ح متراكم

لدينا نصف الحصيص الاجمالي = 10  
الحصيص المتراكم الأكبر مباشرة من 10 هو 14 الموفق لقيمة الميزة 16


وبالتالي القيمة الوسطية هي 16

التمرين الرابع1- لدينا  $f(x) = 3x - 5$ 

x	2	1
$f(x)$	1	-2

وبالتالي تمثيل f هو المستقيم المار من النقاطين (2,1) و (1,-2)

B(1-2)



ب- لدينا P(0,-1) تنتهي الى تمثيل f يعني :

$$f(a) = -1 \Rightarrow 3a - 5 = -1$$

$$3a = -1 + 5$$

$$3a = 4$$

$$a = \frac{4}{3}$$

ومنه :

2- لدينا g دالة خطية

$$g(x) = ax$$

يعني :

لدينا: نصف الحصيص الإجمالي هو  $\frac{N}{2} = 15$

وبالتالي القيمة الوسطية محصورة بين قيمتي الميزة الموافقين للحصيص المترافق 15 و 20

أي القيمة الوسطية بين 152 و 153

نأخذ: 152.5

1- لنحسب معدل القامات

$$M = \frac{2 \times 150 + 7 \times 151 + 6 \times 152 + 5 \times 153}{20}$$

$$M = \frac{3034}{20} = 151.7 \quad \text{إذن:}$$

### التمرين الثاني

1- لحل النظمة

$$\begin{cases} 2x - y - 1 = 0 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases} \quad \text{لدينا:}$$

$$\begin{cases} 2x - y - 1 = 0 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \times 3 \\ \times 2 \end{matrix} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} 6x - 3y - 3 = 0 \\ 6x - 4y = 0 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$(6x - 3y - 3) - (6x - 4y) = 0 \quad \text{نطرح المتساويبتان طرفا بطرف}$$

$$6x - 3y - 3 - 6x + 4y = 0$$

$$\text{يعني: } y = 3$$

$$3x - 6 = 0 \quad \text{لنعرض في المعادلة الثانية:}$$

$$x = 2$$

اذن حل النظمة هو الزوج (2,3)

2- ليكن x ثمن المسطورة الواحدة و y ثمن البركار الواحد  
ثمن مسطرتين أي  $2x$  يفوق ثمن بركار واحد ب 1 درهم  
يعني الفرق بين الثمنين هو 1

$$2x - y = 1 \quad \text{يعني:}$$

$$2x - y - 1 = 0 \quad \text{يعني:}$$

ثمن ثلاثة مسطرات أي  $3x$  يساوي ثمن بركارين أي  $2y$

$$3x = 2y \quad \text{يعني:}$$

$$3x - 2y = 0 \quad \text{يعني:}$$

وبالتالي نحصل على:

$$\begin{cases} 2x - y - 1 = 0 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$$

بـ- بما ان حل النظمة هو الزوج (2,3)

وبالتالي ثمن البركار الواحد هو 3 دراهم

واثمن المسطورة الواحدة هو 2 دراهم

$$f(x) = 2x - 1 \quad \text{اذن: 1- لدينا:}$$

$$f(2) = 2 \times 2 - 1 \quad \text{يعني: 1- 2- ليكن } f \text{ تمثيل } g$$

$$f(2) = 3 \quad \text{اذن: 2- }$$

بـ- ليكن  $f$  تمثيل  $(\Delta)$  و  $(d)$  تمثيل  $g$

$x$	0	2
$f(x)$	-1	3

يعني:  $IC^2 = 64 + 16$

يعني:  $IC^2 = 80$

يعني:  $IC^2 = 16 \times 5$

اذن:  $IC = 4\sqrt{5}$

بـ- لتبين ان  $IG = 12$

لدينا  $(CG) \perp (DC)$  و  $(CG) \perp (BC)$

اذن  $(CG)$  عمودي على المستوى المحدد بـ  $(BC)$  و  $(DC)$

وبالتالي:  $(CG) \perp (BDC)$

وبما ان  $(IC)$  ضمن المستوى  $(BDC)$

فإن:  $(CG) \perp (IC)$

اذن المثلث  $ICG$  قائم الزاوية في

اذن:  $IG^2 = IC^2 + CG^2$

يعني:  $IG^2 = (4\sqrt{5})^2 + (8)^2$

يعني:  $IG^2 = 80 + 64$

يعني:  $IG^2 = 144$

اذن:  $IG = 12$

2- لنحسب حجم الهرم SABFE

$$V_{SABEF} = \frac{1}{3} \times SM \times S_{ABCD} \quad \text{لدينا:}$$

حيث M موقع الارتفاع  
لنحدد SM

يعني:  $(SM) \perp (AF)$

ونعلم ان  $(AD) \perp (AF)$

يعني:  $(SM) \parallel (AD)$

اذن:  $(EB) \perp (EC)$

اذن الرباعي AMSD متوازي الاضلاع

يعني:  $SM = AD = 8$

$$V_{SABEF} = \frac{1}{3} \times 8 \times 8^2 \quad \text{ومنه:}$$

$$V_{SABEF} = \frac{8^3}{3} \quad \text{اذن:}$$

**تصحيح الامتحان 13**

**جهة فاس بولمان**

**يونيو 2006**

**التمرين الأول**

2- لدينا اكبر حصيص قيمته 7 موافق لقيمة الميزة 151

اذن: منول المتسلسلة هو : القامة 151

3- تحديد القامة الوسطية :

القامة	الحصيص	م
153	5	
152	6	
151	7	
150	2	
		20 15 9 2

بـ- لدينا :  $y = \frac{1}{2}x - 2$

نضع :  $y = ax + b$

لدينا:  $(\Delta) // (D)$

يعني:  $a = \frac{1}{2}$

و بالتالي:  $y = \frac{1}{2}x + b$

و بما ان :  $A(-1, -3) \in (\Delta)$

فإن :  $y_A = \frac{1}{2}x_A + b$

يعني:  $-3 = \frac{1}{2} \times -1 + b$

يعني:  $-3 + \frac{1}{2} = b$

اذن :  $b = -\frac{5}{2}$


و منه :  $(\Delta) : y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$

جـ- معامل (L) هو 2 و معامل (D) هو  $\frac{1}{2}$

ولدينا:  $\frac{1}{2} \times 2 = 1$

وبالتالي المستقيمان غير متعاددان

#### التمرين الرابع



2- لدينا C منتصف [BE]

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CE}.$$

وبالتالي E هي صورة C بالإزاحة t

لدينا D هي صورة A بالإزاحة t

لدينا E هي صورة C بالإزاحة t

لدينا C هي صورة B بالإزاحة t

وبالتالي الزاوية  $C\hat{D}E$  هي صورة  $B\hat{A}C$  بالإزاحة t.


$$B\hat{A}C = 90^\circ$$

$$C\hat{D}E = 90^\circ$$

فإن :  $C\hat{D}E$  عمودي على (DE)

اذن :  $M(2;3) \in (\Delta)$  و  $A(0;-1) \in (\Delta)$

x	0	2
$g(x)$	0	3



اذن :  $M(2;3) \in (d)$  و  $O(0;0) \in (d)$

جـ- الحل المبيان هو احدىتي نقطة التقاطع أي الزوج (2,3)

#### التمرين الثالث

1- لنحسب  $AB$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$AB = \sqrt{(2 - 1)^2 + (1 - 3)^2}$$

$$AB = \sqrt{9 + 16}$$

$$AB = 5$$

بـ- لنحدد احدىتي منتصف  $[AB]$

لتكن E منتصف  $[AB]$

$$x_E = \frac{x_A + x_B}{2}$$

$$y_E = \frac{y_A + y_B}{2}$$

$$x_E = \frac{-1 + 1}{2}$$

$$y_E = \frac{-3 + 1}{2}$$

$$x_E = \frac{0}{2}$$

$$y_E = \frac{-2}{2}$$

$$E(0; -1)$$

2- اـ- لدينا معادلة  $(D)$

$$-2y = -x + 4$$

$$y = \frac{-x + 4}{-2}$$

$$y = \frac{1}{2}x - 2$$

**تصحيح الامتحان 14**  
**دكالة عبدة يونيو 2006**

**التمرين الاول**

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x + 5y = 61 \end{cases}$$

- لحل النظمة :

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x + 5y = 61 \end{cases}$$

لدينا:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 20 \times 2 \\ 2x + 5y = 61 \end{cases}$$

يعني :

$$2x + 2y = 20 \times 2 \quad \times 2$$

$$2x + 5y = 61 \quad \times 1$$

نطرح السطر الثاني من الأول :

$$2x + 5y - (2x + 2y) = 61 - 40$$

$$2x + 5y - 2x - 2y = 21$$

يعني :

$$3y = 21$$

يعني :

$$y = 7$$

نعرض  $y = 7$  بقيمتها في إحدى المعادلتين الأصلتين :

$$x + 7 = 20$$

$$x = 13$$

ومنه الزوج (13;7) هو حل النظمة

- 2- ليكن  $x$  هو عدد القطع من فئة 2 دراهمو  $y$  عدد القطع من فئة 5 دراهم

نعلم مجموع نقود احمد هو 61 درهم

$$2x + 5y = 61$$

ونعلم أن مجموع القطع 20

$$x + y = 20$$

$$x = 13$$

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x + 5y = 61 \end{cases}$$

وبالتالي :

نعلم حسب ما سبق حل هذه النظمة :  $x = 13$  و  $y = 7$ 

اذن عدد القطع هو 13 من فئة 2 دراهم و 7 من فئة 5 دراهم

**التمرين الثاني**

- إتمام الجدول :

	1000	900	800	700	600	500	قيم الميزة
4	6	3	4	3	5		الحصيص
25	21	15	12	8	5		المترافق

- 2- منوال المتسلسلة هو قيمة الميزة التي لها اكبر حصيص اكبر حصيص هو 6 و بالتالي المنوال هو 900

- 3- لنحدد القيمة الوسطية

نعلم أن الحصيص الإجمالي يساوي 25

أي نصف الحصيص الإجمالي هو 12.5

اذن قيمة الميزة موافقة لأكبر حصيص متراكم اكبر مباشرة من


$$12.5 \text{ أي } 15$$

و الحصيص المتراكم 15 موافق لقيمة الميزة 800

اذن القيمة الوسطية : 800

- 4- لنحسب المعدل الحسابي :

$$M = \frac{500 \times 5 + 600 \times 3 + 700 \times 4 + 800 \times 3 + 900 \times 6 + 1000 \times 4}{25}$$

**التمرين الخامس**1- لنحسب  $AH$ لدين المثلث  $ADH$  قائم الزاوية في  $D$ 

$$AH^2 = AD^2 + DH^2$$

$$AH^2 = 9^2 + 9^2$$

$$AH^2 = 2 \times 9^2$$

$$AH = 9\sqrt{2}$$

2- لنحسب حجم الهرم  $ACDH$ (  $DH \perp DA$  ) و (  $DH \perp DC$  )(  $DH \perp ADC$  ) يعني :

$$V_{ACDH} = \frac{1}{3} \times DH \times S_{ADC}$$

$$V_{ACDH} = \frac{1}{3} \times 9 \times \frac{9 \times 9}{2}$$

$$V_{ACDH} = 121.5 \text{ cm}^3$$

3- لدينا : (  $CDH \parallel (PNM)$  )(  $MN \parallel (DH)$  ) يعني :اذن في المثلث  $AHD$  حسب مبرهنة طاليس المعاشرة

$$\frac{AM}{AH} = \frac{AN}{AD} = \frac{MN}{DH}$$

$$AM = \frac{1}{3} AH$$

$$\frac{AM}{AH} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{AM}{AH} = \frac{AN}{AD} = \frac{MN}{DH} = \frac{1}{3}$$

وبالتالي سنجد ان الهرم  $AMNP$  تصغير ل  $ACDH$ 


$$\text{بنسبة : } \frac{1}{3}$$

$$V_{AMNP} = \left( \frac{1}{3} \right)^3 \times V_{ACDH} \quad \text{ومنه :}$$

$$V_{AMNP} = \frac{1}{27} \times 121.5 = 4.5 \text{ cm}^3 \quad \text{اذن :}$$

$x$	0	1
$g(x)$	2	4

ادن :  $B(1;4) \in (d)$  و  $A(0;2) \in (d)$



ب - العدد الذي له نفس الصورة بـ  $f$  و  $g$  هو أقصى نقطة التقاطع أي -3

#### التمرين الرابع

1-ا-- لنحدد إحداثي م منتصف  $[AB]$

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{لدينا :}$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

$$x_M = \frac{-2 + 6}{2} \quad \text{يعني :}$$

$$y_M = \frac{3 - 1}{2}$$

$$x_M = 2 \quad \text{يعني :}$$

$$y_M = 1$$

ادن :  $M(1;2)$

ب- لنحدد المعادلة المختصرة لـ  $(AB)$

$(AB): y = ax + b$  نضع :

$$a = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} \quad \text{لدينا :}$$

$$a = \frac{3 - 1}{1 - (-2)} = \frac{4}{3} = \frac{1}{2} \quad \text{يعني :}$$

$$(AB): y = \frac{1}{2}x + b \quad \text{ومنه :}$$

لنحدد  $b$ :

$$y_B = \frac{1}{2}x_B + b \quad \text{لدينا :}$$

$$-1 = \frac{1}{2} \times 6 + b \quad \text{يعني :}$$

$$-1 = -3 + b \quad \text{يعني :}$$

ادن :  $2 = b$

$$M = \frac{2500 + 1800 + 2800 + 2400 + 5400 + 4000}{25} \quad \text{يعني :}$$

$$M = 756 \quad \text{ادن :}$$

ادن المعدل الحسابي هو 756 درهم

#### التمرين الثالث

1- أ- لنحدد الدالة الخطية  $f$  نعلم أن  $M(3,4)$  تتنتمي إلى تمثيل  $f$

$$f(3) = 4 \quad \text{أي :}$$

$$f(x) = \frac{4}{3}x \quad \text{ليكن } a = \frac{4}{3} \text{ ومنه :}$$

$$f(x) = \frac{4}{3}x \quad \text{وبالتالي :}$$

ب- لنحدد الدالة التالية  $g$  التي تحقق معاملها 2 و  $g(-2) = -2$

$$g(x) = 2x + b \quad \text{يعني :}$$

$$g(-2) = 2x + b \quad \text{ومنه :}$$

$$g(-2) = -4 + b \quad \text{أي :}$$

$$-4 + b = -2 \quad \text{و منه :}$$

$$b = 4 - 2 = 2 \quad \text{ادن :}$$

$$g(x) = 2x + 2 \quad \text{وال التالي :}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \quad \text{1- لنحسب}$$

$$f(x) = \frac{4}{3}x \quad \text{وبما ان :}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{4}{3} \times \frac{3}{2} \quad \text{يعني :}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \quad \text{ادن :}$$

$$g\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{لحسب}$$

$$g(x) = 2x + 2 \quad \text{وبما ان :}$$

$$g\left(-\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{-1}{2} + 2 \quad \text{يعني :}$$

$$g\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 + 2 = 1 \quad \text{يعني :}$$

ب- ليكن  $x$  هو العدد الذي صورته بـ  $g$  هي 2

$$g(x) = 2 \quad \text{يعني :}$$

$$2x + 2 = 2 \quad \text{و منه :}$$

$$2x = 2 - 2 \quad \text{يعني :}$$

$$x = 0 \quad \text{ادن :}$$

منه 0 هو العدد الذي صورته هي 2 بـ  $g$

3- ا- ليكن  $(\Delta)$  تمثيل  $f$  و  $(d)$  تمثيل


$x$	0	3
$f(x)$	0	4

ادن :  $M(3;4) \in (\Delta)$  و  $O(0;0) \in (\Delta)$

اذن :  $AB = \sqrt{64+16}$   
 اذن :  $AB = \sqrt{80}$   
 ولدينا:  $PQ = \sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2}$   
 يعني:  $PQ = \sqrt{(4-0)^2 + (5-3)^2}$   
 يعني:  $PQ = \sqrt{(4)^2 + (8)^2}$   
 يعني:  $PQ = \sqrt{16+64}$   
 اذن :  $PQ = \sqrt{80}$   
 ومنه :  $PQ = AB = \sqrt{80}$   
 لنبين ان  $\triangle APBQ$  مربع  
 لدينا:  $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{PB}$ .  
 يعني:  $\triangle APBQ$  متوازي الأضلاع  
 والضلائع  $[PQ]$  و  $[AB]$  متتباون و متقابسان  
 اذن :  $\triangle APBQ$  مربع.

**التمرين الخامس:**

- 1- لدينا  $ABCD$  معين  
 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .  
 وبالتالي صورة  $D$  بالإزاحة  $T$  هي  $C$   
 بـ الشكل



- 2- لدينا صورة  $A$  هي  $B$  بالإزاحة  $T$   
 لدينا صورة  $I$  هي  $J$  بالإزاحة  $T$   
 لدينا صورة  $D$  هي  $C$  بالإزاحة  $T$   
 إذن صورة  $A\hat{I}D$  بالإزاحة  $T$  هي  $B\hat{J}C$   
 بـ بما أن قطر المربع متعامدان

$$\angle AID = 90^\circ$$

- و بما أن صورة  $A\hat{I}D$  بالإزاحة  $T$  هي  $B\hat{J}C$   
 $B\hat{J}C = 90^\circ$  ومنه

وبالتالي المثلث  $BJC$  قائم الزاوية

$$\overrightarrow{DK} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}.$$

إذن  $DBKC$  متوازي الأضلاع

$$\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{DC}.$$

- و منه  $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{DC}$ . و  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .  
 بـ بما ان  $K$  صورة  $B$  بالإزاحة  $T$  ومنه

و منه :  $(AB) : y = \frac{-1}{2}x + 2$   
**ملاحظة :** يمكن الإجابة عن هذا السؤال وذلك باثبات أن **ال نقطتين A و B تحققان المعادلة**.

- 2- 1-  $(\Delta)$  واسط  $[AB]$  يعني :  $(\Delta) \perp (AB)$  و  $(\Delta)$  يمر من منتصف  $[AB]$ .

$$\text{لدينا : } (AB) : y = \frac{-1}{2}x + 2$$

$$\text{و } (\Delta) : y = 2x - 3$$

$$\frac{-1}{2} \times 2 = -1$$

اذن :  $(\Delta) \perp (AB)$

لدينا إحداثي  $M$  منتصف  $[AB]$   
 $M(1; 2)$

لنعرض بـ احداثي  $M$  في معادلة  $(\Delta)$

$$\text{نجد : } 1 = 2 \times 2 - 3$$

$$1 = 1$$

أي :  $M \in (\Delta)$  وبالتالي

اذن  $M \in (\Delta) \perp (AB)$  و  $(\Delta)$  و منه  $(\Delta)$  واسط  $[AB]$ .

$$\text{بـ لدينا : } (\Delta) : y = 2x - 3$$

$$y_P = 2x_P - 3 : P \in (\Delta)$$

$$\text{يعني : } -3 = 2x_0 - 3$$

$$-3 = -3$$

أي :  $P \in (\Delta)$  وبالتالي

3- اللحدد احداثي  $Q$

$$\text{لدينا : } \overrightarrow{AQ}(x_Q - x_A; y_Q - y_A)$$

$$\text{يعني : } \overrightarrow{AQ}(x_Q - 2; y_Q - 3)$$

$$\text{اذن : } \overrightarrow{AQ}(x_Q + 2; y_Q - 3).$$

$$\text{و . } \overrightarrow{PB}(x_B - x_P; y_B - y_P)$$

$$\text{يعني : } \overrightarrow{PB}(6 - 0; -1 - -3)$$

$$\text{اذن : } \overrightarrow{PB}(6; -1 + 3)$$

$$\text{و منه : } \overrightarrow{PB}(6; 2)$$

$$\text{لدينا : } \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{PB}$$

$$\begin{cases} x_Q + 2 = 6 \\ y_Q - 3 = 2 \end{cases} \text{ يعني : } \begin{cases} x_Q = 4 \\ y_Q = 5 \end{cases}$$

$$\text{اذن : } Q(4; 5)$$

بـ لتحقق من ان  $AB = PQ$

$$\text{لدينا : } AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$\text{يعني : } AB = \sqrt{(6 - 2)^2 + (-1 - 3)^2}$$

$$\text{يعني : } AB = \sqrt{(8)^2 + (-4)^2}$$

يعني :

**تصحيح الامتحان 15****جهة سوس ماسة درعة يونيو 2006****التمرين الاول**

$$\begin{cases} 2x - 3y = 11 \\ 4x + y = 15 \end{cases} \quad \text{لحل النظمة:}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y = 11 \\ 4x + y = 15 \end{cases} \quad \text{لدينا:}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y = 11 & (2) \\ y = 15 - 4x & (1) \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} 2x - 3(15 - 4x) = 11 \\ y = 15 - 4x \end{cases} \quad \text{نجد:}$$

$$\begin{cases} 2x - 45 + 12x = 11 \\ y = 15 - 4x \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} 14x = 11 + 45 \\ y = 15 - 4x \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} 14x = 56 \\ y = 15 - 4x \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 15 - 4x \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = -1 \end{cases} \quad \text{اذن:}$$

ومنه الزوج (-1; 4) هو حل النظمة

**التمرين الثاني**

- أ- لنحسب  $f(1)$

$$f(x) = 3x - 2 \quad \text{لدينا:}$$

$$f(1) = 3 \times 1 - 2 \quad \text{يعني:}$$

$$f(1) = 1 \quad \text{أي:}$$

ب- لدينا:  $A(0, 2)$

$$f(0) = 2 \quad \text{يعني: } A \in (\Delta)$$

$$f(0) = 3 \times 0 - 2 \quad \text{وبما أن:}$$

$$f(0) = -2 \quad \text{اذن:}$$

$A \notin (\Delta)$  وبالتالي:


$$\text{لدينا: } B\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{2} \quad \text{يعني: } B \in (\Delta)$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 3 \times \frac{3}{2} - 2 \quad \text{وبما أن:}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{2} - 2 \quad \text{اذن:}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{2} \quad \text{أي:}$$

**التمرين السادس**

1- لتحديد  $OA$  في المستوى  $(ADC)$  لدينا في المثلث  $ADC$  قائم الزاوية في  $D$

$$AC^2 = AD^2 + DB^2$$

$$AC^2 = (3\sqrt{2})^2 + (3\sqrt{2})^2$$

$$AC^2 = 36$$

$$AC = 6$$

وال التالي: وبما ان  $O$  منتصف  $[AC]$

$$OA = 3$$

ب- لدينا  $(SO)$  ارتفاع

وبالتالي: في المثلث  $SAO$  القائم الزاوية في  $O$

حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة

$$SO^2 = SA^2 - AO^2$$

$$SO^2 = 5^2 - 3^2$$

$$SO^2 = 25 - 9 = 4^2$$

$$SO = 4\text{cm}$$

ج- لنحسب مساحة المربع  $ABCD$

$$S_{ABCD} = AB^2 = (3\sqrt{2})^2 = 18\text{cm}^2$$

لحسب حجم الهرم:

$$V_{SABCD} = \frac{1}{3} \times SO \times S_{ABCD}$$

$$V_{SABCD} = \frac{1}{3} \times 4 \times 18$$

$$V_{SABCD} = 24\text{cm}^3$$

$$\frac{SA'}{SA} = \frac{2}{5}$$

و بالتالي نسبة التصغير  $\frac{2}{5}$

ب- الهرم  $SA'B'C'D'$  هو تصغير ل  $SABCD$  بنسبة  $\frac{2}{5}$

و بالتالي:

$$S_{A'B'C'D'} = \left(\frac{2}{5}\right)^2 \times S_{ABCD} = \frac{4}{25} \times 18 = \frac{76}{25}\text{cm}^2$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} : \text{لدينا}$$

$$AB = \sqrt{(5)^2 + (-5)^2} : \text{يعني}$$

$$AB = \sqrt{50} : \text{يعني}$$

$$AB = 5\sqrt{2} : \text{اذن}$$

2- لحدد احداثي منتصف  $[AB]$

لتكن I منتصف  $[AB]$

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} : \text{يعني}$$

$$y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$$

$$x_I = \frac{4+1}{2} : \text{يعني}$$

$$y_I = \frac{-2+3}{2}$$

$$x_I = \frac{3}{2} : \text{يعني}$$

$$y_I = \frac{1}{2}$$

$$I\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right) : \text{اذن}$$

3- لحدد CI

$$CI = \sqrt{(x_I - x_C)^2 + (y_I - y_C)^2} : \text{بما أن}$$

$$CI = \sqrt{\left(\frac{3}{2} - 2\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - 4\right)^2} : \text{يعني}$$

$$CI = \sqrt{\left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{7}{2}\right)^2} : \text{يعني}$$

$$CI = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{49}{4}} : \text{يعني}$$

$$CI = \sqrt{\frac{50}{4}} : \text{يعني}$$

$$CI = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{4}} : \text{يعني}$$

$$CI = \frac{5\sqrt{2}}{2} : \text{يعني}$$

الاستنتاج :

بما أن I منتصف  $[AB]$

$$AI = IB = \frac{AB}{2} : \text{فإن}$$

$$AI = IB = \frac{5\sqrt{2}}{2} : \text{يعني}$$

$$AI = BI = CI : \text{اذن}$$

اذن I تبعد عن رؤوس المثلث ABC بنفس المسافة


اذن ABC مثلث قائم الزاوية

اذن :  $B \in (\Delta)$

- جـ

لدينا

x	0	1
$f(x)$	-2	1



اذن :  $F(1;1) \in (\Delta)$  و  $E(0;-2) \in (\Delta)$

2- لنمثل الدالة الخطية g التي يمر تمثيلها من B

ليكن (d) تمثيل g

ب- تحديد صيغة g

بما أن : g دالة خطية

$$g(x) = ax : \text{فإن}$$

$$a = \frac{g(x)}{x} : \text{يعني}$$

بما أن (d)

$$g\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{2} : \text{يعني}$$

$$a = \frac{g\left(\frac{3}{2}\right)}{\frac{3}{2}} : \text{نجد}$$

$$a = \frac{5}{\frac{2}{3}} = \frac{5}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{3} : \text{يعني}$$

$$g(x) = \frac{5}{3}x : \text{اذن}$$

### التمرين الثالث

1- لحدد احداثي  $\overrightarrow{AB}$ .

لدينا  $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$ .

يعني :  $\overrightarrow{AB}(4-1; -2-3)$ .

اذن :  $\overrightarrow{AB}(5; -5)$ .

لحسب  $AB$

$$\frac{500+x}{21} = 25 \quad \text{أي :}$$

$$500+x = 25 \times 21 \quad \text{أي :}$$

$$x = 25 \quad \text{اذن :}$$

**التمرين السادس**1- لنحدد الارتفاع  $SO$ لدينا في المستوى  $(SDB)$  $[DB] = SD$  و  $O$  منتصف  $[SB]$ اذن :  $(SO)$  واسط للقطعة  $[DB]$ وبالتالي : في المثلث  $SDO$  القائم الزاوية في  $O$ 

حسب مير هنة فيتاغورس المباشرة

$$SO^2 = SD^2 - DO^2 \quad \text{نجد :}$$

لنحدد  $DO$ لدينا في المستوى  $(ADB)$ :المثلث  $ADB$  قائم الزاوية في  $A$ 

$$DB^2 = AD^2 + AB^2 \quad \text{اذن :}$$

$$DB^2 = (3\sqrt{2})^2 + (3\sqrt{2})^2 \quad \text{أي :}$$

$$DB^2 = 36 \quad \text{أي :}$$

$$DB = 6 \quad \text{وال التالي :}$$

و بما ان  $O$  منتصف  $[DB]$ 

$$DO = 3 \quad \text{فإن :}$$

$$SO^2 = SD^2 - DO^2 \quad \text{و بما ان :}$$

$$SO^2 = 5^2 - 3^2 \quad \text{فإن :}$$

$$SO^2 = 16 \quad \text{أي :}$$

$$SO = 4 \quad \text{اذن :}$$

2- لنحسب حجم المجسم  $ABCDA'B'C'D'$ ليكن  $V$  حجم  $ABCDA'B'C'D'$ و  $SABCD$  حجم  $V_1$ و  $SA'B'C'D'$  حجم  $V_2$ لدينا العلاقة التالية :  $V = V_1 - V_2$ ونعلم ان  $A'$  منتصف  $[SA]$  و  $B'$  منتصف  $[SB]$ 

$$A'B' = \frac{AB}{2} \quad \text{فإن :}$$

وهكذا نجد أن  $A'B'C'D'$  هو تصغير ل  $SABCD$  بنسبة

$$\frac{1}{2} \quad \text{تساوي :}$$

$$V_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 V_1 \quad \text{وبالتالي :}$$

$$V_2 = \frac{1}{8} V_1 \quad \text{أي :}$$


$$V = V_1 - V_2 \quad \text{و بما أن :}$$

$$V = V_1 - \frac{1}{8} V_1 \quad \text{فإن :}$$

$$V = \frac{7}{8} V_1 \quad \text{أي :}$$

**التمرين الرابع**

- 1- أ- لدينا الازاحة ذات المتجهة  $\overrightarrow{AI}$   
اذن صورة  $A$  هي  $I$   
ب-

2- لنبين ان المثلث  $BDI$  متساوي الاضلاع :بما ان  $D$  هي صورة  $B$  بالازاحة  $t$ و  $I$  هي صورة  $A$  بالازاحة  $t$ اذن:  $DI=AB$ أي:  $DI=2$ بما ان  $D$  هي صورة  $B$  بالازاحة  $t$ يعني:  $AI=BD$ وبما أن:  $I$  منتصف  $[AB]$ اذن  $I$  تبعد عن رؤوس المثلث  $ABC$  بنفس المسافة

$$AI = IB = \frac{AB}{2} \quad \text{يعني:}$$

AI=2  $\quad \text{يعني:}$ BD=2  $\quad \text{يعني:}$ اذن في المثلث  $IBD$  : لدينا  $IB=DI=BD=2$ اذن: المثلث  $BDI$  متساوي الاضلاع**التمرين الخامس**

1- جدول الحصصيات :

الحصص	قيمة الميزة	38	37	30	29	28	24	22	18	17
		1	1	3	1	2	4	3	3	2

2- احسب المعدل الحسابي :

$$M = \frac{17 \times 2 + 18 \times 3 + 22 \times 3 + 24 \times 4 + 28 \times 2 + 29 \times 1 + 30 \times 3 + 37 \times 1 + 38 \times 1}{20} \quad \text{ادن :}$$

$$M = \frac{500}{20}$$

$$M = 25$$

3- ليكن  $x$  هو سن المنخرط الجديد

المعدل الحسابي لم يتغير

$$M = 25 \quad \text{أي:}$$

وبما ان

$$M = \frac{17 \times 2 + 18 \times 3 + 22 \times 3 + 24 \times 4 + 28 \times 2 + 29 \times 1 + 30 \times 3 + 37 \times 1 + 38 \times 1 + 1 \times x}{21} \quad \text{يعني :}$$

$$M = \frac{500+x}{21}$$

**خاتمة**

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلوة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه فهذا العمل المتواضع تطلب جهداً دام مدة زمنية تجاوزت 60 يوماً، البداية كانت يوم 02/02/2012 ونهاية كانت اليوم 12/04/2012 لذا أدعو كل تلميذ توفر على هذه النسخة إلى الجدية.

إنجاز هذه الامتحانات ليس الهدف منه فقط النجاح خلال هذه السنة وإنما التأسيس لنهجية البحث لدى كل واحد أو واحدة منكم فالتوجه العلمي يقتضي دائماً البحث عن وضعيات وتمارين مختلفة من أجل تطوير المكتسبات والتعرف على مهارات جديدة.

ومن خلال هذه الكلمة أدعو الجميع إلى اقتناء كتب تضم تمارين محلولة فثمنها زهيد مقارنة مع ما يشم انفاقه على الملبس والرافعيات ....

وفي الأخير أتمنى للجميع التوفيق والنجاح سواء كان دراسياً أو مهنياً والله المعين

و السلام عليكم

لحسب  $V_1$

$$V_1 = \frac{1}{3} S_{ABCD} \times SO^2$$

$$V_1 = \frac{1}{3} (3\sqrt{2})^2 \times 4^2$$


$$V_1 = 3 \times 8$$

$$V_1 = 24$$

$$V = \frac{7}{8} \times 24$$

$$V = 21$$

ان



ذ: خالد هشامى

السنة الثالثة من السلسلة الثانوية الإعدادية

3



امتحانات محلية مصححة